



REGISTRO MÁS AUSTRAL DE TANGARÁ GRIS (*Thlypopsis sordida*)

José Aris Martínez¹

¹ Correo electrónico: josearismartinez@gmail.com

El Tangará Gris (*Thlypopsis sordida*), es un ave integrante de la familia Thraupidae que posee un característico capuchón amarillo oro con amplia corona rufa, dorso gris oliváceo, pecho gris ocráceo y ventral blancuzco. Los sexos no presentan dimorfismo notable, distinguiéndose los juveniles de los adultos por su corona y dorso oliváceo, además de tener la cara, la garganta y el pecho amarillos (Narosky e Yzurieta, 2010).

La especie es residente permanente en un área extremadamente amplia de Sudamérica, que abarca desde Venezuela hasta el norte y centro de Argentina (BirdLife International, 2012). En Argentina solo está presente la subespecie nominal *T. s. sordida* (De la Peña, 2012) y cuenta con registros para las provincias de Jujuy (Burgos *et al.*, 2009), Salta (Zotta, 1940; Camperi, 1990; Salvador, 1990; Babarskas *et al.*, 1995; Coconier *et al.*, 2007), Tucumán (Lucero, 1983; Rougés y Blake, 2001), Catamarca (Nores e Yzurieta, 1982; Vides Almonacid, 1999; Nores *et al.*, 2000), Entre Ríos (De la Peña *et al.*, 2003), Corrientes (Esteban, 1953; Darrieu y Camperi, 1994; Fraga, 2001; Chatellenaz, 2004; Capllonch *et al.*, 2005; Chatellenaz *et al.*, 2010), Misiones (Camperi y Darrieu, 2000), Chaco (Chatellenaz, 2005), Formosa (Nores, 1992; Di Giacomo y Krapovickas, 2005), Santa Fe (Pautasso, 2002; De la Peña, 2011) y extremo nordeste de Buenos Aires donde existe una antigua cita en el río Paraná de las Palmas, Delta bonaerense, en mayo de 1978 (Narosky, 1983) en donde no se dan mayores detalles de la observación indicando que fue hallada en una zona de monte, y es repetida por Narosky y Di Giacomo (1993) y De la Peña (2012). Su hábitat natural son las selvas y bosques tropicales y subtropicales (Narosky e Yzurieta, 2010; BirdLife International, 2012).

El 22 de septiembre de 2012, en el espigón lindante al acceso de avenida Brasil de la Reserva Ecológica Costanera Sur (34° 36' 59.87" S; 58° 21' 18.17" O), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, observé un ejemplar adulto de Tangara Gris (Figura N° 1) que en

un primer momento sobrevoló perdiéndose rápidamente entre el espeso follaje del lugar y luego de unos minutos reapareció para posarse brevemente sobre una rama del árbol exótico Paraíso (*Melia azedarach*), a una distancia de aproximadamente cuatro metros. Durante el tiempo que duró la observación el ave se movía en forma inquieta pero al mismo tiempo se mostraba curiosa y relativamente confiada.

El lugar donde se realizó el registro es una zona boscosa con grandes árboles y suelos húmedos. Cabe mencionar que esta especie no se encuentra incluida en la Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (Pugnali y Chamorro, 2006). Si bien no descartamos que se trate de un ejemplar escapado o liberado, existe una publicación que sugiere la presencia accidental de la especie en la provincia de Buenos Aires (Narosky, 1983). Se deja documentado el registro más austral de Tangará Gris.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Sr. Mario Camardella por la compañía en el momento de la observación.

BIBLIOGRAFÍA

BABARSKAS, M., J. VEIGA Y F. FILIBERTO. 1995. *Lista Sistemática de las aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina*. Monografía 6. L.O.L.A. Buenos Aires.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2012. *Species factsheet: Thlypopsis sordida*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 18/12/2012.

BURGOS, F. G., J. L. BALDO Y F. M. CORNELL. 2009. *Lista de las aves de la Provincia de Jujuy, Argentina*. Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy. S. S. de Jujuy.



ecoregistros.com.ar
Registros Ecológicos de la Comunidad



Figura N° 1. Tangará Gris (*Thlypsopsis sordida*) en la Reserva Ecológica Costanera Sur el 22 de septiembre de 2012. Fotografía: José Aris Martínez.

CAMPERI, A. R. 1990. Notas sobre una colección de aves del Río Santa María, Salta, Argentina. *Hornero*, 13(2): 147-151.

CAMPERI, A. R. Y C. A. DARRIEU. 2000. Estudio de una colección de aves del sur de la provincia de Misiones. *Physis Sec. C* 58: 79-83.

CAPLLONCH, P., LOBO, R., ORTIZ, D. Y R. OVEJERO. 2005. La avifauna de la selva de galería en el noreste de Corrientes, Argentina: Biodiversidad, patrones distribución y migración. *Insugeo, Miscelanea*, 14: 483-498.

CHATELLENAZ, M. L. 2004. Avifauna del Bosque de Quebracho Colorado y Urunday del noreste de Corrientes, Argentina. *Facena*, 20: 3-12.

CHATELLENAZ, M. L. 2005. Aves del Valle del Río Paraná

en la provincia del Chaco, Argentina: riqueza, historia natural y conservación. *Insugeo, Miscelanea*, 14: 527-550.

CHATELLENAZ, M. L., P. D. CANO, C. SAIBENE Y H. A. BALL. 2010. Inventario de las aves del Parque Nacional Mburucuyá (Provincia de Corrientes, Argentina). *Acta Zoologica Lilloana*, 54: 139-150.

COCONIER, E.G., LOPEZ LANÚS, B., ROELER, I., MOSCHIONE, F., PEARMAN, M., BLENDINGER, P., BODRATI, A., MONTELEONE, D., CASAÑAS, H., PUGNALI, G. Y M. E. ALVAREZ. 2007. *Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión Acambuco*. Pp: 32-103. En COCONIER, E. G. (Ed.). *Las aves silvestres de Acambuco*, Provincia de Salta, Argentina. *Temas de Nat. y Cons.* N° 6. *Nuestras Aves AOP*.

DARRIEU, C. A. Y A. R. CAMPERI. 1994. Estudio de una



colección de aves de Corrientes: Thraupidae e Icteridae. *Neotropica*, 40: 49-55.

DE LA PEÑA, M. R. 2011. *Atlas ornitogeográfico de la Provincia de Santa Fe*. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza y Conservación N° 4. Santa Fe, Argentina. 500pp.

DE LA PEÑA, M. R. 2012. *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: informe preliminar*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica, 770 pp.

DE LA PEÑA, M. R., M. MANASSERO, J. L. LÓPEZ Y H. LUNA. 2003. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fé y Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves*, 45: 32-35.

DI GIACOMO, A. G. Y S. F. KRAPOVICKAS. 2005. *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina*. Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires. 1-592.

ESTEBAN, J. G. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zoologica Lilloana*, 13: 349-362.

FRAGA, R. M. 2001. The avifauna of Estancia San Juan Poriahú, Iberá Marches, Argentina.: checklist and some natural history notes. *Cotinga*, 16: 81-86.

LUCERO, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la Provincia de Tucumán. *Miscelánea*, N° 75. Fund. M. Lillo. Tucumán. Págs. 61.

NAROSKY, S. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero*, 12(2): 122-126.

NAROSKY, T. Y A. DI GIACOMO. 1993. *Las Aves de la Provincia de Buenos Aires*. L.O.L.A. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

NORES, M. 1992. Bird speciation in subtropical South America in relation to forest expansion and retraction. *Auk*, 109: 346-357.

NORES, M. Y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. *Historia Natural*, 2: 102-104.

NORES, M., S. A. SALVADOR Y D. YZURIETA. 2000. Registros de aves de selva en Catamarca, Argentina. *Hornero*, 15(2): 111-115.

PAUTASSO, A. 2002. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 43: 19-21.

PUGNALI, G. Y P. CHAMORRO (compiladores). 2006. *Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur*. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires.

ROUGÉS, M. Y J. G. BLAKE. 2001. Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque Biológico Sierra de San Javier, Tucumán. *Hornero*, 16(1): 7-15.

SALVADOR, S. A. 1990. Datos de peso de aves argentinas. *Hornero*, 13(2): 169-171.

VIDES ALMONACID, R. 1999. Aves. En: Lavilla, E.O. y J.A. Gonzalez (Ads.). *Biodiversidad de Agua Rica (Catamarca, Argentina)*. BHP Cooper, Fundación Miguel Lillo.

ZOTTA, A. R. 1940. Lista sistemática de las aves argentinas. *Hornero*, 7(3): 447-472.