



PRIMEROS REGISTROS, NUEVAS LOCALIDADES, OBSERVACIÓN DE AVES CON DOCUMENTACIÓN ESCASA Y EVIDENCIAS DE NIDIFICACIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE MENDOZA, SAN JUAN, LA RIOJA, CATAMARCA Y TUCUMÁN, ARGENTINA

Francisco Lucero¹ y Federico Izasa²

¹ Ruta N° 901 S/N, Cienaguita (5431), provincia de San Juan, Argentina. Correo electrónico: francilucero@hotmail.com

² El Encuentro S/N, Malligasta (5361), provincia de La Rioja, Argentina. Correo electrónico: federicoizasa@gmail.com

Los estudios ornitológicos que incluyen las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán se han realizado desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta nuestra actualidad. Aquellos trabajos pioneros fueron en su mayoría listados con escasa mención y precisión de localidades de los cuales destacamos los siguientes: Lillo (1902), Giacomelli (1905; 1907; 1923), Fontana (1908), Dabbene (1910), Reed (1916), Sanzin (1918) y Reed (1921). También se destacan numerosas guías y listados internacionales, nacionales, provinciales y regionales presentando mapeos generales con escasa mención de localidades concretas (Koslowsky, 1895; Olrog, 1959; 1963; 1979; Lucero, 1983; Fjeldsa y Krabbe, 1990; Olrog y Pescetti, 1991; De la Peña y Rumboll, 1998; De la Peña, 1999; Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Carma, 2007; Narosky e Yzurietta, 2010; De la Peña, 2013). Diversas publicaciones sobre relevamientos en áreas protegidas o áreas de interés para su protección y departamentos provinciales (Roig, 1965; Contreras y Fernández, 1980; Darrieu *et al.*, 1989; Haene y Chebez, 1991; Ortiz y Murúa, 1994; Haene *et al.*, 1995; Sosa, 1995; Haene y Montañez, 1996; Chebez *et al.*, 1998; Haene y Montenegro, 1999; Pereyra Lobos, 1998a, 1998b, 1999; Márquez, 1999; Sosa y Vallvé, 1999; Acosta y Murúa, 2001; Haene *et al.*, 2001; Acosta y Murúa, 2002; Haene, 2005; Pescetti, 2005; Sosa, 2005; Campos *et al.*, 2007; Ortiz y Borghi, 2007; Lobo Allende *et al.*, 2009; Olivera *et al.*, 2009; Silverio *et al.*, 2009; Ferrer *et al.*, 2011; Subsecretaría de Medio Ambiente, 2010; Fava *et al.*, 2012; Lucero, 2013) y numerosos trabajos sobre especies puntuales. Están aquellos trabajos que reúnen datos de ejemplares colectados y depositados en museos y publicaciones con localidades concretas, lo que ha generado mayor claridad sobre los estudios de la avifauna propia de este sector del país como son los siguientes: Camperi y Darrieu (2000-2001), Camperi y Darrieu (2002-2004), Camperi y Darrieu (2004), Camperi *et al.* (2008), Alderete *et al.* (2013), Antelo y Brandán

Fernández (2013) y Darrieu (2014). En el desarrollo de este artículo seguimos el razonamiento, concepto e interpretación de estos últimos autores donde indican sólo las especies con presencia convalidada por menciones con localidad concreta, pieles de especímenes colectados y depositados en museos, descartando las menciones en los listados sin evidencias de localidad puntual como también los mapeos generales de provincias o regiones sin especificaciones. Por otro lado existen mencionadas en publicaciones pioneras (Giacomelli, 1907; 1923) localidades que en la actualidad resultan inexistentes en campo, ejemplo de ello son las localidades de "Chacra La Merced", "Pozo de Almonacid", "Paso del Recreo" que no hallamos en nuestras campañas de relevamiento ya que el crecimiento inmobiliario de las ciudades, específicamente la ciudad de La Rioja, no ha dejado evidencias, haciendo inciertos aquellos registros de aves en esas localidades, por consiguiente y a nuestro criterio exponemos nuevas primeras localidades concretas para algunas de las especies mencionadas en dicho manuscrito.

Pese al amplio enfoque, dinámica y progresivo estudio realizado sobre las aves, datos como la distribución geográfica, nidificación, grado de amenaza y presencia concreta en estas provincias, especialmente en dos de ellas, San Juan y La Rioja, de donde provienen la mayoría de los registros presentados en esta nota, todavía existen interrogantes a dilucidar. Hemos reunido y aportamos datos novedosos y evidencias sobre treinta y una especies de aves con distinto interés ornitológico dado el hallazgo realizado en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán. De los hallazgos realizados distinguimos entonces, especies sin ningún tipo de mención previa de localidad ni evidencias de pieles en museos, en algunos casos especies incluidas en listados departamentales o provinciales sin datos puntuales de hallazgos o bien especies incluidas en



mapeos sin precisar localidades concretas y también especies mencionadas con localidades inexistentes en la actualidad.

Los siguientes resultan ser primeros registros provinciales con localidad concreta, es el caso del Picaflor Enano (*Microstilbon burmeisteri*), la Mosqueta de Ojos Dorados (*Hemitriccus margaritaceiventer*) y el Volatinero (*Volatinia jacarina*) para la provincia de San Juan, el Inambú Serrano (*Nothoprocta ornata*), el Mirasol Común (*Ixobrychus involucris*), la Garza Mora (*Ardea cocoi*), el Chajá (*Chauna torquata*), el Pato Zambullidor Chico (*Oxyura vittata*), el Carau (*Aramus guarauna*), la Pollona Negra (*Gallinula galeata*), la Pollona Pintada (*Gallinula melanops*), el Colibrí Grande (*Colibri coruscans*), el Payador Canela (*Diglossa sittoides*) y el Pecho Colorado (*Sturnella superciliaris*) para la provincia de La Rioja, el Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*) y la Pollona Pintada para la provincia de Catamarca.

Especies que poseen una mención con localidad concreta, concluyéndose en que los siguientes registros son entonces segundos registros provinciales con nuevas localidades, ellas son: la Jacana (*Jacana jacana*), el Tero Serrano (*Vanellus resplendens*), la Gallareta Escudete Rojo (*Fulica rufifrons*), la Gallineta Común (*Pardirallus sanguinolentus*), la Dormilona Cara Negra (*Muscisaxicola maclovianus*), y el Negrillo (*Sporagra atrata*) para la provincia de La Rioja y el Cisne de Cuello Negro (*Cygnus melanophaius*) para la provincia de Catamarca. Para el Macá Grande (*Podiceps major*) es la primera observación criando y con nueva localidad en la provincia de San Juan y se menciona su reproducción en embalses artificiales en el norte de la provincia de Mendoza, además se comentan nuevas localidades y observación de especies con escasos registros documentados como lo son el Jote Real (*Sarcoramphus papa*), el Durmili (*Nystalus maculatus*) y el Doradito Pardo (*Pseudocolaptes dinelliana*) para San Juan, el Esparvero Común (*Accipiter erythronemius*), la Agachona de Collar (*Thinocorus orbignyianus*), la Agachona Grande (*Attagis gayi*) para La Rioja, el Vencejo de Collar (*Streptoprocne zonaris*) para Catamarca y el Vencejo Pardo (*Cypseloides rothschildi*) para la provincia de Tucumán.

Para finalizar esta introducción, es meritorio destacar

el importante aporte que la fotografía de aves ha generado en estos últimos tiempos, apoyando un artículo de divulgación de orientación científica, al que le otorga un ensamble completo, teórico y visual del momento estudiado y sobre todo presenta una evidencia palpable que en muchos casos a dilucidado interrogantes propios de aquellos trabajos pioneros que presentaban ciertas dudas y se convierte en una herramienta que nos permite realizar un trabajo completo de divulgación zoogeográfica.

Inambú Serrano (*Nothoprocta ornata*)

La Rioja

El Inambú Serrano se distribuye en Argentina en Prepuna y estepas altoandinas (Narosky e Yzurieta, 2010) desde los 2500 y 4000 m s. n. m., en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja (De la Peña, 2013). Si bien las menciones son numerosas para la provincia de La Rioja éstas consisten en enfoques y mapeos generales (Olrog, 1959; Fjeldsa y Krabbe, 1990; Olrog y Pescetti, 1991; Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013) no hallándose localidades concretas en distintas publicaciones consultadas (Koslowsky, 1895; Giacomelli, 1907, 1923; Nore, 1995; Camperi *et al.*, 2008; Bodrati y Ferrari, 2014, Lobo Allende *et al.*, 2014). El 6 de octubre de 2014 (Federico Isaza) observó y fotografió un ejemplar en el paraje Tres Piedras, departamento Famatina en las siguientes coordenadas: 28° 50' 39,40" S; 67° 46' 56,81" O a los 3289 m s. n. m. (Figura N° 1). Es este el primer registro del Inambú Serrano con localidad concreta para la provincia de La Rioja.

Macá Grande (*Podiceps major*)

Provincias de San Juan y Mendoza

Distribuido ampliamente en Argentina (De la Peña, 2013). Para la provincia de San Juan la primera observación sobre su presencia es mencionada en Ortíz y Murúa (1994) siendo observado en el arroyo del Agua Negra. Gelain y Pereyra Lobos (2011a) lo hallaron en el dique embalse Ullúm, departamento de Ullúm, en tanto Lucero (2012; 2013) observó la especie en dos localidades del departamento Sarmiento. El 2 de mayo de 2014, en el dique



embalse Cauquenes, departamento Jáchal, 30° 08' 54,09" S; 68° 37' 13,41" O a 1110 m s. n. m., Francisco Lucero evidencia el primer evento reproductivo del Macá Grande en la provincia de San Juan, sumando además una nueva localidad para la provincia. Dos parejas de esta especie se hallaban en el área más profunda del dique, distantes 400 metros entre sí. Una pareja con un juvenil (Figura N°2) y otra con dos juveniles. Si bien, los ambientes acuáticos naturales en la provincia de San Juan se encuentran en un progresivo desecamiento por causa antrópica, el Macá Grande se está observando con mayor frecuencia en los diques y embalses construidos para acumulación de agua y generación de energía eléctrica. Recientemente ha sido mencionado en el Cheklist de Valle Fértil (Cailly Arnulphi y Ariza, 2013) y observado también en el dique embalse San Agustín, departamento Valle Fértil por F. Lucero en diferentes oportunidades. Para la provincia de Mendoza El Macá Grande posee numerosos registros (Darrieu, 2014), pero el constante deterioro del área de Guanacache en el departamento Lavalle, lo ha enrarecido notablemente en el norte provincial. No obstante, las represas construidas para regadío agrícola le proveen alimentación, estacionamiento temporario y en este caso nidificación. El 26 de diciembre de 2014 en la localidad de Jocolí, departamento Lavalle, 32° 31' 28,87" S; 68° 38' 56,30" O a 582 m s. n. m., en una represa de 18 hectáreas aproximadamente F. Lucero observó dos parejas con juveniles (Figura n°3). Estas observaciones evidencian que a consecuencia de la pérdida de hábitat natural en donde el Macá Grande habitaba, la especie está ocupando espacios menores y artificiales en los cuales encuentra condiciones apropiadas para su reproducción en el área de Guanacache.

Jote Real (*Sarcoramphus papa*)

San Juan

El Jote Real se distribuye en Argentina en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, extremo noreste de Buenos Aires, noroeste de San Luis y el extremo noreste de San Juan (De la Peña, 2013). Para San Juan el primer registro es mencionado en Haene (1987) observación realizada en una quebrada al oeste de la localidad de

Astica. Haene *et al.*, (1995) observaron el 15 de enero de 1989, dos ejemplares en la quebrada del arroyo Las Tumanas. Recientemente, el 4 de agosto de 2014, en el paraje Santa Gema, departamento Valle Fértil, 30° 54' 22,46" S; 67° 18' 45,90" O a 697 m s. n. m F. Lucero observó una pareja percheda sobre ramas secas de un quebracho (*Aspidosperma quebracho blanco*) (Figura N°4). Esta ocasional observación ocurre en medio de una gran actividad de carroñeros, entre los cuales se destaca la presencia de alrededor de treinta ejemplares de Jote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) y Jote Cabeza Colorada (*Cathartes aura*) una decena de ejemplares de Cóndor Andino (*Vultur gryphus*) muchos sobrevolando e intentando descender para alimentarse de algún animal muerto oculto entre el matorral compuesto de Garabato (*Acacia furcatispina*), Chañar Brea (*Cercidium australe*) entre la vegetación que se destaca correspondiente al Chaco occidental. Esta observación, otras vertidas por pobladores locales y las menciones de las décadas del 80 y 90 del siglo pasado, confirman la ocurrencia del Jote Real asiduamente en el extremo este de la provincia de San Juan donde la muerte de los animales de criadores locales (ganado vacuno, caballar y caprino) resultado de atropellamientos o causas naturales, son una fuente de alimento adicional a la propia fauna autóctona que sostiene las poblaciones de estos carroñeros alados.

Chajá (*Chauna torquata*)

La Rioja

De amplia distribución en Argentina (De la Peña, 2013) para la provincia de La Rioja existe solo una mención (Giacomelli, 1907) de un ejemplar coleccionado por el señor Carreras, depositado en el museo de Florencia, sin más detalles, también lo menciona como muy rara y ocasional para La Rioja (Giacomelli, 1923). Existen mapeos para la provincia sin mencionar localidades (Olrog, 1959; Olrog y Pescetti, 1991; De la Peña, 1999; Narosky y Yzurieta, 2010). Camperi *et al.*, (2008) no listan la especie por carecer de datos precisos de observación. El 28 de agosto de 2014, en la localidad de Carrizal, departamento Famatina, provincia de La Rioja 28° 53' 25,39" S; 67° 33' 33,45" O a los 1727 m s. n. m., Federico Izasa observó y fotografió un individuo solitario de Chajá en un ambiente natural de



potreros inundados. Puede causar dudas la procedencia del ejemplar ya que es una especie que naturalmente se observa en pareja o fuera de época de reproducción en bandadas numerosas. En tanto el 4 de enero de 2015, en el dique Los Sauces, departamento Sanagasta, provincia de La Rioja F. Lucero observó cuatro parejas de Chajá distribuidos en las orillas del dique, en prados inundados y curiosamente una pareja se encontraba apostada sobre formaciones de areniscas a unos 100 mts de altura en el cerro próximo al espejo de agua en las siguientes coordenadas: 29° 22' 16,42" S; 66° 59' 11,40" O a 880 m s. n. m. (Figura N°5). Estos registros son los primeros con mención de localidad concreta para la provincia de La Rioja y posiblemente el dique Los Sauces sea un sitio donde el Chajá presente evidencias de nidificación en la provincia.

Cisne de Cuello Negro (*Cygnus melanophaius*)

Catamarca

El Cisne de Cuello Negro se distribuye ampliamente por Argentina (Narosky e Yzurieta; De la Peña, 2013). Para la provincia de Catamarca es mapeada como migratorio por Olrog (1959) y en forma marginal de presencia dudosa por Narosky e Yzurieta (2010). Las menciones concretas para la provincia de Catamarca son escasas. Camperi y Darrieu (2001- 2002) no mencionan la especie para la provincia. Carma (2007) es la única mención concreta y con evidencias, donde se lo observó en la laguna La Alumbra, departamento Antofagasta de la Sierra en el año 2007. El 22 de marzo de 2015, en la localidad de Cortaderas, a la vera de la ruta nacional n° 60, camino al Paso de San Francisco, departamento Tinogasta (27° 33' 31,97" S; 68° 08' 44,30" O a 3371 m s. n. m) F. Izasa observó un solitario ejemplar de Cisne de Cuello Negro (Figura N°6). Este es el segundo registro para la provincia de Catamarca.

Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*)

Catamarca

El Coscoroba se distribuye ampliamente por Argentina (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Para la provincia de Catamarca no existen observaciones con localidad concreta ni evidencias.

Narosky e Yzurieta (2010) mapean la especie en forma marginal, de distribución dudosa. Igualmente De la Peña (2013) mapea al Coscoroba para Catamarca sin mención provincial. No ha sido mencionado por Camperi y Darrieu (2000- 2001), en tanto Carma (2007) tampoco infiere la presencia de la especie en la provincia. El 22 de marzo de 2015, F. Izasa observó tres ejemplares de Coscoroba en la localidad de Cortaderas, ruta nacional n°60, camino al Paso de San Francisco, departamento Tinogasta (27° 33' 31,97" S; 68° 08' 44,30" O a 3371 m s. n. m) (Figura N°7).

Garza Mora (*Ardea cocoi*)

La Rioja

La Garza Mora se distribuye en Argentina ampliamente por todo el país, siendo ocasional en las Islas Malvinas (De la Peña, 2013). Para la provincia de La Rioja existen menciones en Giacomelli (1907; 1923) donde no incluyen localidades concretas, probablemente Camperi *et al.*, (2008) no listan la especie dado la imprecisión del dato. En dos localidades F. Izasa observó individuos solitarios. El primero el 14 de noviembre de 2011, en la localidad de Angulos, departamento Famatina, 28° 39' 20,93" S; 67° 36' 45,94" O a 1760 m s. n. m y la segunda observación se realizó el 20 de marzo de 2012 en Chañarmuyo, departamento Famatina 28° 37' 23,53" S; 67° 36' 31,76" O a 1700 m s. n. m. (Figura N°8). Estas son las primeras evidencias con localidad concreta de la Garza Mora para la provincia de La Rioja.

Mirasol Común (*Ixobrychus involucris*)

La Rioja

El Mirasol Común se distribuye ampliamente por Argentina (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). El 29 de febrero de 2012, en la localidad de Angulos, departamento Famatina, provincia de La Rioja, 28° 39' 20,93" S; 67° 36' 45,94" O a 1760 m s. n. m., F. Izasa observó y fotografió un ejemplar en un pequeño humedal donde crecen totoras, carrizos y escasos juncos. El ejemplar permaneció inmóvil como es su conducta habitual (Figura N°9). Solo existe una mención de Giacomelli (1907) donde la



Menciona como *Ardetta involucris* sin precisar localidades. No existen datos concretos sobre la especie (Koslowsky 1895; Bodrati y Ferrari, 2014), solo mapeos generales que incluyen al Mirasol Común en la provincia (Olrog, 1959; Olrog y Pescetti, 1991; De la Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2010) pero la falta de datos puntuales de observación los hacen imprecisos y no han sido considerados en Camperi *et al.*, (2008). La observación presentada corresponde a la primera evidencia del Mirasol Común con localidad concreta para la provincia de La Rioja.

Tero Serrano (*Vanellus resplendens*)

La Rioja

El Tero Serrano se distribuye en Argentina en áreas andinas de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan con observaciones en la provincia de Córdoba (De la Peña, 2013). Para la provincia de La Rioja Olrog (1979) menciona la especie sin precisar localidades, en tanto Navas y Camperi (2005) la señalan en base a material colectado de la localidad de San Blas de Los Sauces, sin determinar sexo, se trata de un ejemplar de agosto de 1914 colectado por E. Gemignani y depositado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN). El 7 de octubre de 2011 en el paraje Tres Piedras, departamento Famatina, en las siguientes coordenadas: 28° 50' 46,62" S; 67° 46' 59,24" O a 3317 m s. n. m., F. Izasa observó y fotografió un ejemplar adulto desplazándose en el pastizal de altura. Este registro corresponde a la segunda mención con localidad concreta para la provincia de La Rioja. (Figura N° 10).

Pato Zambullidor Chico (*Oxyura vittata*)

La Rioja

El Pato Zambullidor Chico se distribuye ampliamente por Argentina exceptuando el noreste (De la Peña, 2013). En la provincia de La Rioja existen escasas referencias. Giacomelli (1907) menciona la caza de este pato en Pozo de Almonacid sin más detalles, en tanto Giacomelli (1923) menciona que es ocasional en tiempos de lluvias en represas. Paynter (1995) menciona este sitio próximo a ciudad de La Rioja no

ha sido localizado, incluyendo coordenadas tomadas de (USBGN) United States Board on Geographical Names. Camperi *et al.*, (2008) listan la especie citando a Giacomelli (1907). Actualmente, dicha localidad es inexistente en campo, la expansión de la ciudad de La Rioja ha urbanizado los alrededores de aquella antigua ciudad del año 1907. Las coordenadas expuestas en Paynter (1995) y mencionadas en Camperi *et al.*, (2008) comprenden en la actualidad todo un complejo urbanístico dejando sin rastros de lo que pudo haber sido Pozo de Almonacid. El 20 de febrero de 2010, F. Izasa observó varios ejemplares de Pato Zambullidor Chico en el dique de Chañarmuyo, departamento Famatina 28° 37' 23,53" S; 67° 36' 31,76" O a 1700 m s. n. m., donde se tomaron algunas fotografías (Figura N° 11) y el 5 de enero de 2015, en el dique Los Sauces, departamento Sanagasta F. Lucero observó un pequeño grupo de seis ejemplares. Estos son los primeros registros con localidad concreta y precisa para La Rioja.

Carau (*Aramus guarauna*)

La Rioja

De amplia dispersión en Argentina (De la Peña, 2013) para La Rioja existe escasa mención sin precisar localidad y categorizándola como no rara (Giacomelli, 1907, 1923). Olrog (1959) y Olrog y Pescetti (1991) también mencionan a la provincia de La Rioja como distribución del Carau, sin mencionar localidades concretas. No hay observaciones sobre la especie en diferentes publicaciones consultadas (Koslowsky, 1895; Camperi *et al.*, 2008; Lobo Allende *et al.*, 2009; Bodrati y Ferrari, 2014). El 9 de enero de 2011, F. Izasa observa un ejemplar de Carau en un charco temporario en la localidad de Patquia, departamento Independencia en las siguientes coordenadas: 30° 00' 59,88" S; 67° 57' 59,30" O a 470 m s. n. m. (Figura N° 12). Esta observación es la primera con localidad concreta para la provincia.

Jacana (*Jacana jacana*)

La Rioja

La Jacana se distribuye en Argentina desde el norte hasta San Luis, Córdoba y Buenos Aires (De la Peña,



2013). En la provincia de La Rioja Giacomelli (1907; 1923) la nombra Sacha pollito, mencionándolo como no raro en las represas sin precisar localidades de observación. Hayward (1967) menciona la primera localidad concreta que es Guayapa. El 28 de abril de 2015, F. Izasa observó dos ejemplares de Jacana juveniles a orillas de una represa en la localidad de Angulos, departamento Famatina, provincia de La Rioja 28° 38' 54,54" S; 67° 38' 57,77" O a 1854 m s. n. m. (Figura N°13). Esta es la segunda localidad concreta para la provincia de La Rioja. .

Pollona Negra (*Gallinula galeata*)

La Rioja

La Pollona Negra en Argentina se distribuye por el centro-norte del territorio, prefiriendo humedales con abundante vegetación (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Para la provincia de La Rioja no existen referencias sobre su presencia en la bibliografía específica consultada (Koslowsky, 1895; Giacomelli, 1907, 1923; Camperi *et al.*, 2008; Lobo Allende *et al.*, 2009; De la Peña, 2013; Bodrati y Ferrari, 2014). Olrog (1959) y Olrog y Pescetti (1991) mapean a la Pollona Negra para La Rioja sin precisar localidades. El 14 de febrero de 2012, F. Izasa descubre una pequeña laguna formada por aguas subterráneas que tras chocar contra una formación basáltica emerge creando un humedal con abundante vegetación compuesta por totoras, carrizos, juncos, con sus perímetros rodeados de chilcales y bobadales. El particular humedal se encuentra en la localidad de Angulos, departamento Famatina, en las siguientes coordenadas geográficas: 28° 39' 20,93" S; 67° 36' 45,94" O a 1760 m s. n. m. En este pequeño humedal, se halló una población de Pollona Negra y en sucesivas recorridas al área en época de reproducción se evidenció su establecimiento y nidificación. Finalmente el 11 de octubre de 2014, los autores de este artículo visitaron el sitio, observando varios ejemplares de Pollona Negra compartiendo el hábitat con gallinetas comunes (*Pardirallus sanguinolentus*) donde se tomaron algunas fotográficas (Figura N° 14). Esta es la primera evidencia y localidad concreta de la Pollona Negra para la provincia de La Rioja.

Pollona Pintada (*Gallinula melanops*)

Catamarca y La Rioja

De distribución amplia en Argentina (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Dos interesantes registros fueron realizados por F. Izasa. El 6 de abril de 2012, en la localidad de Cortaderas (camino a Paso San Francisco), departamento Tinogasta, provincia de Catamarca en las siguientes coordenadas: 27° 33' 31,97" S; 68° 08' 44,30" O a 3371 m s. n. m., observó un ejemplar solitario desplazándose y alimentándose de la vegetación flotante de una laguna (Figura N° 15). Para la provincia de Catamarca no existen menciones de localidades precisas (Camperi y Darrieu, 2001). Carma *et al.*, (2007) comenta su hábitat de ambientes acuáticos sin precisar localidades, además existe una observación del señor Carlos Barrionuevo que por inconvenientes en el sitio de publicación no fue debidamente documentada en el año 2009. Los días 13 y 20 de junio de 2012, en la localidad de Alpasínche, departamento San Blas de Los Sauces, provincia de La Rioja 28° 18' 48,77" S; 67° 02' 59,25" O a 938 m s. n. m., F. Izasa observó ejemplares solitarios en una pequeña laguna temporaria ubicada a la vera de la ruta nacional N° 40 (Figura N° 16). En tanto para la provincia de La Rioja, las menciones son escasas, Giacomelli (1907; 1923) menciona la especie de observaciones posiblemente alrededor de la ciudad de La Rioja, en tanto Olrog (1959) y Olrog y Pescetti (1991) mencionan y mapean la especie sin precisar localidades.

Gallineta Común (*Pardirallus sanguinolentus*)

La Rioja

La Gallineta Común se distribuye ampliamente por toda Argentina (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). En la provincia de La Rioja Giacomelli (1907, 1923) menciona que no es rara en las represas, sin precisar datos ni localidades. Hayward (1967) la menciona para la localidad de Guayapa siendo la única mención precisa. El 31 de octubre de 2011 en un pequeño humedal situado en la localidad de Angulos, departamento Famatina en las siguientes coordenadas: 28° 39' 20,93" S; 67° 36' 45,94" O a 1760 m s. n. m., F. Izasa observa algunos ejemplares de Gallineta Común. En sucesivos viajes al sitio, F. Izasa advierte que cría en el humedal (Figura N° 17). En tanto el 4 de enero de 2015, en el dique Los



Sauces, departamento Sanagasta, provincia de La Rioja, F. Lucero oye la vocalización de la Gallineta Común en el interior de un totoral: 29° 22' 16,42" S; 66° 59' 11,40" O a 880 m s. n. m.

Gallareta de Escudete Rojo (*Fulica rufifrons*)

La Rioja

Ampliamente distribuida en Argentina exceptuando la provincia de Misiones (De la Peña, 2013). Para la provincia de La Rioja la única mención con localidad corresponde a Hayward (1967). El 4 de enero de 2015, en el dique Los Sauces, departamento Sanagasta: 29° 22' 16,42" S; 66° 59' 11,40" O a 880 m s. n. m., se observan varios ejemplares, algunos en la costa, otros próximos a la vegetación palustre en los perímetros del cuerpo de agua. También se hallaron juveniles evidenciándose la reproducción de la Gallareta de Escudete Rojo en la provincia (Figura N° 18).

Agachona de Collar (*Thinocorus orbignyianus*)

Existen tres menciones de esta agachona para la provincia de La Rioja, Giacomelli, (1923) comenta la observación en un potrero privado en la sierra sin más detalles. Chebez, (2005) y Moschione y Sureda (2007) la mencionan para la Reserva Provincial Laguna Brava como integrante de su avifauna. Dos registros son realizados por F. Izasa en el cordón de Famatina el 14 de noviembre de 2010, en los alrededores de Cueva de Pérez, 29° 00' 13,41" S; 67° 44' 17,35" O a 3978 m s. n. m. y el 28 de octubre de 2014 en el paraje Tres Piedras 28° 50' 39, 40" S; 67° 46' 56,81" O a 3289 m s. n. m. parajes ubicados en el departamento Famatina (Figura N° 19). Nores (1995) quien realizó un relevamiento sobre las aves andinas en el cordón de Famatina no la menciona. Estas observaciones agregan un nuevo sitio en la provincia con datos concretos de localidad y fecha de observación precisa.

Agachona Grande (*Attagis gayi*)

La Agachona Grande se distribuye por la cordillera de Los Andes desde Jujuy hasta Santa Cruz (De la Peña, 2013). En la provincia de La Rioja existen menciones

para Famatina (Nores, 1995) y para la Reserva Provincial Laguna Brava (Chebez, 2005; Moschione y Sureda, 2007). El 25 de abril de 2013, en el Portezuelo de Illanes, departamento Famatina, 29° 01' 02,10" S; 67° 46' 56,81" O a 4268 m s. n. m., F. Izasa observó una pareja recorriendo el pedregullo y la vegetación propia de ese ambiente de altura en búsqueda de alimento (Figura N° 20). Si bien Nores (1995) menciona a la Agachona Grande para el cordón de Famatina, la misma carece de localidad concreta.

Esparvero Común (*Accipiter erythronemius*)

La Rioja

De amplia distribución en Argentina (De la Peña, 2013), para La Rioja las menciones con precisión de localidad son escasas. Giacomelli (1907, 1923) la menciona para Saladillo, localidad cercana a la ciudad de La Rioja, Hayward (1967) para la localidad de Guayapa, en tanto Nores y Cerana (1990) para la localidad de El Cantadero. El 12 de octubre de 2014 en el paraje Las Talas, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, 29° 06' 49,49" S; 67° 35' 24,24" O a 1585 m s. n. m., F. Lucero observó un ejemplar alimentándose de un pequeño passeriforme (Figura N° 21). Esta mención es una nueva localidad para la provincia de La Rioja ubicada ascendiendo el cordón del Famatina.

Vencejo de Collar (*Streptoprogne zonaris*)

Catamarca

El Vencejo de Collar se encuentra distribuido en Argentina por las provincias andinas desde Jujuy hasta Mendoza y en las provincias de Misiones, Santa Fe y Entre Ríos (De la Peña, 2013). En la provincia de Catamarca son escasas las observaciones con datos precisos de localidad. Camperi y Darrieu (2000-2001) no detallan observaciones del Vencejo de Collar. Carma (2007) menciona la localidad de Palo Blanco ubicada en el departamento Tinogasta como lugar de observación sin más detalles. Martín De la Peña observó la especie en la localidad de Agua de Las Palomas en el departamento Andalgalá el 11 de marzo de 1981 (De la Peña, 2013). El 8 de enero de 2015, F. Lucero observó una veintena de vencejos de



collar que se alimentaban en ágiles vuelos a orillas de la ruta nacional N° 40, sobre la costa este del río Cerro Colorado al sur de la localidad de Punta de Balasto, en el departamento Santa María, provincia de Catamarca en las siguientes coordenadas: 27° 00' 01,90" S; 66° 14' 57,92" O a 2182 m s. n. m. (Figura N° 22).

Vencejo Pardo (*Cypseloides rothschildi*)

Tucumán

La distribución del Vencejo Pardo en Argentina comprende las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Tucumán y La Rioja (De la Peña, 2013). Para Tucumán son escasas las menciones de localidades, Dabbene (1918) menciona que anida en la provincia sin mención de localidades. Escaso también es el material de estudio, una hembra sin mención de localidad colectada en el año 1900, un macho de la localidad de Tapia, año 1901, una hembra de la localidad de Concepción, año 1917 y un ejemplar sin mención de sexo procedente de San Miguel de Tucumán, año 2007 (Antelo y Brandán Fernández, 2013). Para la Reserva La Florida es mencionada por Navarro *et al.*, (2007). No es mencionada para Tafi del Valle (Capllonch, 2007). El 6 de enero de 2015, en la localidad de Tafi del Valle, F. Lucero observó varios grupos de vencejos negruzcos dirigiéndose de norte a sur y realizó algunas fotografías documentales (Figura N° 23).

Colibrí Grande (*Colibri coruscans*)

La Rioja

Mencionado por Nores (1995) para la Sierra de Famatina sin datos precisos de localidad. No ha sido observado o colectado por diferentes autores (Koslowsky, 1895; Giacomelli, 1905, 1907, 1923; Hayward, 1967; Nores y Cerana, 1990; Lobo Allende *et al.*, 2009; Bodrati y Ferrari, 2014). El 9 de enero de 2015, F. Lucero y F. Izasa escucharon y observaron al Colibrí Grande en tres puntos a la vera del camino que conduce hacia la mina "La Mejicana", departamento Famatina, provincia de La Rioja. Se observaron grupos de 2 a 3 ejemplares en cada sitio. Los lugares de observación son los siguientes: El

Cañon del Ocre, 28° 54' 09,35" S; 67° 41' 14,00" O a 2743 m s. n. m.; Río Amarillo, 28° 54' 40,40" S; 67° 41' 01,99" O a 2770 m s. n. m.; sitio sin nombre, 28° 56' 30,63" S; 67° 40' 52,80" O a 2973 m s. n. m. (Figura N° 24).

Picaflor Enano (*Microstilbon burmeisteri*)

Picaflor pequeño que se distribuye por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Córdoba (De la Peña, 2013). Narosky e Yzurieta (2010) menciona que frecuente Yungas, mientras que se lo halló en formaciones de bosques de Chaco serrano en la provincia de Córdoba (Spinuzza, 2009). El 26 de abril de 2015, en la localidad de Cienaguita, departamento Sarmiento, provincia de San Juan en las siguientes coordenadas geográficas 32° 04' 36,39" S; 68° 41' 22,15" O a 721 m s. n. m., F. Lucero observó un ejemplar hembra de Picaflor Enano alimentándose en flores de Muérdago o Liga (*Ligaria cuneifolia*), planta hemiparásita que se aferra a las ramas de diferentes árboles y arbustos nativos como son el Algarrobo Dulce (*Prosopis flexuosa*), la Jarilla (*Larrea* sp), el Chañar (*Geoffroea decorticans*) como también en arboledas implantadas tales como el Olivo (*Olea europaea*) y el Fresno (*Fraxinus* sp) entre otras especies vegetales. Se lo observó por escaso tiempo y se lograron algunas fotografías donde se observan detalles característicos de la especie (Figuras N° 25 y 26). Este es el primer registro del Picaflor Enano para la provincia de San Juan, siendo el más austral en su distribución.

Durmilí (*Nystalus maculatus*)

San Juan

El Durmilí se distribuye en Argentina por las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, extremo noroeste de Santa Fe, noroeste de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, noreste de San Juan y extremo norte de San Luis. En San Juan es de presencia rara, siendo las únicas menciones precisas las de Nores e Yzurieta (1982) y Nores y Salvador (1996). El 5 de abril de 2015, en el paraje Santa Gema, departamento Valle Fértil (30° 54' 41" S; 67° 18' 54" O) a 701 m s. n. m F. Lucero escuchó la vocalización de la especie a escasa distancia de la ruta provincial 501. Luego observó dos ejemplares en



lo alto de un Quebracho Blanco desde donde vocalizaban (Figura N° 27).

Mosqueta de Ojos Dorados (*Hemitriccus margaritaceiventer*)

San Juan

La Mosqueta de Ojos Dorados se distribuye en Argentina por todo el norte hasta San Luis y Buenos Aires (De la Peña, 2013). El 2 de noviembre de 2014, camino a la localidad de Los Bretes, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan en las siguientes coordenadas geográficas 30° 45' 37,50" S; 67° 26' 12,41" O a 1043 m s. n. m., F. Lucero percibió la vocalización de esta pequeña mosqueta entre el ramaje enmarañado de un Tala (*Celtis sp*) y luego la observó moviéndose entre algarrobos (*Prosopis sp*) y molles de beber (*Lithraea molleoides*) donde se realizó la toma de algunas fotografías de registro. El 15 de noviembre se observó nuevamente a la Mosqueta de Ojos Dorados en el mismo sitio. Días después, el señor Andrés Arias custodio ambiental de la Reserva Natural de Usos Múltiples Valle Fértil, le comentó a F. Lucero la observación de otro ejemplar en una quebrada denominada Santa Rosa, próxima a la Localidad de Valle Fértil. Las evidencias demuestran que varios son los ejemplares que han ingresado a la provincia de San Juan dispersándose por la serranía con vegetación propia de Chaco occidental. El 23 de febrero de 2015 F. Lucero vuelve al sitio de hallazgo y observa nuevamente a la Mosqueta de Ojos Dorados, demostrándose la presencia continua de este pequeño tiránido en la presente temporada estival en el área. Estas observaciones son las primeras para la Mosqueta de Ojos Dorados en la provincia de San Juan (Figura N° 28).

Dormilona Cara Negra (*Muscisaxicola maclovianus*)

La Rioja

La Dormilona Cara Negra se distribuye y nidifica en la Patagonia, migrando hacia el centro-norte de Argentina (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Pergolani de Costa (1975) señala su distribución desde Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego, migrando en otoño hacia el norte hasta

Jujuy, llegando a Bolivia, Perú y Chile. En la provincia de La Rioja recientemente se dieron a conocer las primeras observaciones con localidades precisas (Lobo Allende *et al.*, 2014). En dos oportunidades el 27 de abril de 2011 y el 24 de agosto de 2011 en la localidad de Angulos, departamento Famatina, provincia de La Rioja, 28° 39' 20,93" S; 67° 36' 45,94" O a 1760 m s. n. m. F. Izasa observó ejemplares solitarios de Dormilona Cara Negra sobre los paredones rocosos a orillas de un arroyo (Figura N° 29). Estas observaciones constituyen nuevas localidades a la poco conocida distribución de esta especie para la provincia de La Rioja.

Doradito Pardo (*Pseudocolopteryx dinelliana*)

San Juan

El Doradito Pardo ha sido registrado recientemente en la provincia de San Juan (Lucero, 2013) distante de sus áreas de distribución y nidificación conocidas (Chebez, 2008). Las nuevas observaciones de esta especie en la provincia de San Juan amplían su distribución hacia pequeños humedales en el sur de la provincia y evidencian su establecimiento y nidificación en el área de Guanacache. El 31 de agosto de 2014 se observó un grupo de 4 a 6 ejemplares en los Bañados del Carau, departamento Sarmiento, 32° 06' 26,84" S; 68° 23' 11,85" O a 545 m s. n. m. (Figura N° 30). En distintas visitas al humedal, nuevamente se observaron ejemplares dispersos y al menos tres territorios de vida, como también se los observó en el perímetro de la Laguna Guanacache.

Payador Canela (*Diglossa sittoides*)

La Rioja

El Payador Canela es un thraupido de curioso pico curvo y con gancho que utiliza para alimentarse en flores libando néctar y pequeños insectos. Se distribuye en Argentina desde Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). El 2 de abril del 2011, en el paraje Las Talas, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, 29° 06' 49,49" S; 67° 35' 24,24" O a 1585 m s. n. m., F. Izasa observó un individuo al que sólo pudo tomar una fotografía de evidencia. El 15 de octubre de



2014, F. Lucero visitó el área, oyendo la vocalización de la especie entre la frondosa arboleda de un establecimiento privado sin poder fotografiarlo, en tanto el 16 de enero de 2015, camino a la mina La Mejicana, en el paraje Cueva de Noñora, departamento Famatina, 28° 56' 30,63" S; 67° 40' 52,80" O a 2973 m s. n. m., F. Izasa observó dos ejemplares de Payador Canela de sexo macho, alimentándose en flores de *Mutisia kurtzii* var. *Anómala* (Figura N°31). Destacamos que dicha planta, abundante en el área, es también fuente de recursos alimenticios para cuatro especies de trochilidos observados, ellos son, el Picaflor Andino (*Oreotrochilus leucopleurus*), el Colibrí Grande, el Picaflor Gigante (*Patagona gigas*) y el Picaflor Cometa (*Sappho sparganura*). El Payador Canela no ha sido mencionado en la bibliografía consultada (Koslowsky, 1895; Giacomelli, 1907, 1923; Nores y Cerana, 1990; Nores, 1995; Camperi *et al.*, 2008; Lobo Allende *et al.*, 2009; Bodrati y Ferrari, 2014). Estas son las primeras evidencias para la provincia de la Rioja siendo las más australes en su distribución hasta ahora conocida.

Pecho Colorado (*Sturnella superciliaris*)

La Rioja

El Pecho Colorado es el más pequeño de las tres especies del Género *Sturnella* que habitan Argentina. En la provincia de La Rioja los únicos registros son los de Giacomelli (1907, 1923) donde lo señalan en "Chacra La Merced", localidad no hallada (Paynter, 1995) y lo categorizan como Raro en La Rioja. El 26 de julio de 2011, en la localidad de Famatina, departamento Famatina, provincia de La Rioja en las siguientes coordenadas 28° 54' 25,75" S ; 67° 32' 06,40" O a 1626 m s. n. m., F. Izasa observó una pequeña bandada de Pecho Colorado dispersas en pastizales alimentándose (Figura N° 32).

Volatinero (*Volatinia jacarina*)

San Juan

El Volatinero se distribuye en Argentina desde el norte del país hasta el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza (De la Peña, 2013). Para la provincia de San Juan no hay

evidencias precisas en la bibliografía consultada (Fontana, 1908; Camperi y Darrieu, 2004; Lucero, 2013). Gelain y Pereyra Lobos (2011b) listan al Volatinero pero la mención es imprecisa careciendo de fecha y localidad de registro. Cailly Arnulphi y Ariza, (2013) mencionan a la especie en el Checklist de Valle Fértil, sin precisar localidades puntuales ni datos de observación. El 2 de febrero de 2015, en la localidad de Cienaguita, departamento Sarmiento, provincia de San Juan 32° 04' 21" S; 68° 41' 45" O a 731 m s. n. m, F. Lucero oye la vocalización de este pequeño Thraupido y luego observó un ejemplar adulto macho sobre chilcales en ambientes modificados donde existen pequeños manchones de Chañar y Algarrobo Dulce. Luego logró tomar algunas evidencias fotográficas (Figura N° 33). Este es el primer registro con evidencias del Volatinero en la provincia de San Juan.

Negrillo (*Sporagra atrata*)

La Rioja

El Negrillo se distribuye en Argentina por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza entre los 2500 y 4000 m s. n. m. (De la Peña, 2013). Para la provincia de La Rioja los antecedentes documentales constan de mapeos generales sin mención de localidad concreta (Olrog, 1959; Olrog y Pescetti, 1991; Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Lobo Allende *et al.* (2009) mencionan al Negrillo en un Listado de las Aves de Chilecito, sin mención de localidad concreta, en tanto Bodrati y Ferrari (2014) no citan dicho listado y presentan las primeras menciones con localidad concreta y fecha de observación mencionando el hallazgo de pequeños grupos en la Reserva Provincial Laguna Brava y áreas circundantes. El 3 de febrero de 2011, F. Izasa observó varios individuos de Negrillo en el paraje Las Placetas, departamento Chilecito en las siguientes coordenadas: 29° 05' 17,00" S; 67° 42' 40,83" O a 2680 m s. n. m (Figura N°34) y el 9 de enero de 2015, en el camino que desde la localidad de El Carrizal asciende hacia la mina La Mejicana, departamento Famatina, provincia de La Rioja, a partir de los 2900 m s. n. m., F. Lucero y F. Izasa observaron individuos solitarios, parejas y pequeños grupos de 4 a 6 ejemplares de Negrillo. Se los observó próximos al paraje "Cueva de Pérez" y a la mina La Mejicana hasta los 4300 m s. n. m. Nores



(1995) no halló al Negrillo en los relevamientos realizados en la Sierra de Famatina en los meses de noviembre de 1985 y marzo de 1986, probablemente la especie no se hallaba en el área en esas fechas dado su hábito migratorio post-reproducción. Estas son nuevas localidades concretas en la acotada y escasamente conocida distribución del Negrillo en la provincia de La Rioja.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco especialmente a mi amigo Federico Izasa quien confió sus excelentes registros para que este trabajo se publique en coautoría, además a los revisores de este artículo quienes realizaron un destacado trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- ACOSTA, J. C. Y F. MURÚA. 2001. Inventario de la avifauna de la Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (Segunda serie), 3: 1- 4.
- ACOSTA, J. C. Y F. MURÚA. 2002. Estatus de Conservación de la Avifauna del Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (Segunda serie), 9: 1- 7.
- ALDERETE, O., P. CAPLLONCH, S. AVELDAÑO, J. MAMANÍ, O. QUIROGA Y T. MORENO. En: 2013. Los Passeriformes de Tucumán, Argentina. Lista, Distribución y Migración. *Biológica*, 16: 39-71. Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino.
- ANTELO, C. Y Z. BRANDÁN FERNÁNDEZ. 2013. Las aves no Passeriformes de Tucumán, Argentina. *Miscelánea*, 132. Fundación Miguel Lillo, Argentina.
- BODRATI, A. Y C. FERRARI. 2014. Nota sobre 36 especies de aves o poco conocidas para la provincia de La Rioja. *Nuestras Aves*, 59: 30- 42.
- CAILLY ARNULPHI, V. B. Y M. G. ARIZA. 2013. Lista de Aves de Valle Fértil. *Bird Checklist*. SAyDS- Municipalidad de Valle Fértil, provincia de San Juan.
- CAMPERI, A. R. Y C. A. DARRIEU. 2000 (2001). Avifauna de Catamarca: Lista comentada de especies (No passeriformes). *Physis*, Secc. C. 58: 67-68.
- CAMPERI, A. R. Y C. A. DARRIEU. 2002 (2004). Avifauna de Catamarca: Lista comentada de especies (Passeriformes). *Physis*, 60: 25-40. Buenos Aires, Secc. A.
- CAMPERI, A. R. Y C. A. DARRIEU. 2004. Avifauna de la provincia de San Juan: lista comentada de especies. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 6: 147-164.
- CAMPERI, A. R., C. A. DARRIEU Y M. JUÁREZ. 2008. Avifauna de la provincia de La Rioja (Argentina): lista comentada de las especies. *Acta zoológica lilloana*, 52 (1-2): 76-97.
- CAMPOS, C. M., C. E. BORCHI; S. M. GIANNONI; S. G. ORTÍZ Y G. PATRAN. 2007. *La fauna de los desiertos de altura: características, usos y potencialidades en la zona de influencia de San Guillermo*. 139 p. ZETA Editores Argentina.
- CAPLLONCH, P. 2007. *Aves de Tafi del Valle*. Edición del Autor. 44 págs.
- CARMA, M. I. 2007. *Colección Flora y fauna de la provincia de Catamarca. Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca*. Consejo Federal de Inversiones.
- CHEBEZ, J. C. 2005. *Guía de las reservas naturales de la Argentina: Zona Centro*. Editorial Albatros, Buenos Aires.
- CHEBEZ, J. C. 2008. *Los que se van. Fauna argentina amenazada*. Tomo 2: 416 págs., Albatros, Buenos Aires.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS, Y A. G. DI GIACOMO. 1998. *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial L.O.L.A. N° 12, 127 págs., Buenos Aires.
- CONTRERAS, J. R. Y A. FERNÁNDEZ. 1980. Biología de la avifauna de la Laguna del Viborón, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza. *Revista del Museo de Ciencias Naturales de San Rafael*, 8: 3- 14.
- DABBENE, R. 1910. Ornitología Argentina. *Anales del*



Museo Nacional de Buenos Aires, 11: 1- 513.

DABBENE, R. 1918. Nidos y huevos de vencejos. *Hornero*, I: 193.

DARRIEU, C. A. 2014. Aves de la provincia de Mendoza, Argentina: Lista de especies (no Paseriformes). *Acta Zoológica Lillioana*, 58 (1): 94- 132.

DARRIEU, C. A., M. M. MARTÍNEZ, Y G. E. SOAVE. 1989. Estudio de la avifauna de la Reserva Provincial Llancanelo, Mendoza. III. Nuevos registros de nidificación de aves acuáticas (Podicipedidae, Threskiornithidae, Anatidae, Rallidae, Laridae). *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral*, 20 (1 y 2): 81-90.

DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves Argentinas, Lista y Distribución. L.O.L.A. Buenos Aires, 244 págs.

DE LA PEÑA, M. R. 2013. *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica, 786 pp.

FAVA, G. A., J. C. ACOSTA, J. A. LASPIUR Y M. V. MORENO. 2012. Avifauna del Valle de Calingasta y alrededores, provincia de San Juan, Argentina. *Acta Zoológica Lillioana*, 56 (1-2): 66-81.

FERRER, D., U. LARDELLI Y R. OLIVERA. 2011. Propuesta para declarar sitio AICA al Parque Provincial Aconcagua y al Monumento Natural Puente del Inca, Las Heras, Mendoza, Argentina. *Biológica*. Informes Técnicos. N° 14. 71-75. Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, Santa Fe.

FJELDSA, J. Y N. KRABBE. 1990. *Birds of the High Andes*. Zoological Museum, University of Copenhagen y Apollo books. 876 págs., Svendborg, Dinamarca.

FONTANA, L. J. 1908. *Enumeración sistemática de las aves de la región andina (Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca)*. Escuela Nacional de Industrias Químicas de San Juan. Buenos Aires. 16 págs.

GELAIN, M. A. Y R. PEREYRA LOBOS. 2011a. Aves con escasos registros en la provincia de San Juan familias Podicipedidae y Anatidae. *Xolmis*, N° 8. Centro de Registros Ornitológicos (CRO) San Juan, Argentina.

GELAIN, M. A. Y R. PEREYRA LOBOS. 2011b. Lista de aves

de la provincia de San Juan, Argentina. *Xolmis*, N° 3. Centro de Registros Ornitológicos (CRO) San Juan, Argentina.

GIACOMELLI, E. 1905. Notes systématiques et biologiques sur les colibris de la province de La Rioja (République Argentine). *Anales de la Sociedad Científica Argentina*, 59: 97-112.

GIACOMELLI, E. 1907. Catálogo sistemático de la avifauna riojana. *Anales de la Sociedad Científica Argentina*, (1) 63: 280-301.

GIACOMELLI, E. 1923. Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la provincia de La Rioja. *Hornero*, III (1): 66-84.

HAENE, E. H. 1987. Nuevos registros para la avifauna sanjuanina. *Nuestras Aves*, 12: 18- 19.

HAENE, E. 2005. Reserva de la Biosfera San Guillermo págs. 393-395 en: DI GIACOMO, A. S. (ED.) *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

HAENE, E. Y A. MONTAÑEZ. 1996. Notas sobre aves de la Reserva de la Biosfera San Guillermo (provincia de San Juan, República Argentina). *Nuestras Aves*, 34: 47-48.

HAENE, E. Y J. C. CHEBEZ. 1991. *Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, Provincia de San Juan, República Argentina*. Ed. Dic. 1991. Gobierno de la Provincia de San Juan, Administración de Parques Nacionales y Fundación Ambientalista Sanjuanina.

HAENE, E. Y L. MONTENEGRO. 1999. *Catálogo de Fauna de la Reserva Natural Estricta El Leoncito*. 18 págs.

HAENE, E., A. MONTAÑEZ, A. CARRIZO, G. BODRATI, J. BONO, G. KRAUSS, E. MÉRIDA, C. NARDINI, R. RODRÍGUEZ, J. JONES Y A. PÉREZ. 2001. Primer Inventario de los animales Vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina). *Boletín de la Sociedad Biológica de Concepción (Chile)*, 72: 59- 67.

HAENE, E., S. F. KRAPOVICKAS, F. MOSCHIONE Y D. GÓMEZ.



1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. *Hornero*, XIV (1-2):48-52.
- HAYWARD, K. J. 1967. Fauna del noroeste argentino. 1. Las aves de Guayapa (La Rioja). *Acta Zoológica Lilloana*, 22: 211- 220.
- KOSLOWSKY, J. 1895. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito, La Rioja. *Revista del Museo de La Plata*, 6: 277-287.
- LILLO, M. 1902. *Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*, 8: 169-221.
- LOBO ALLENDE, I. R., BORTNYK, P. Y CHANI, J. M. 2014. Aportes a la avifauna de la provincia de La Rioja, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 58 (1): 161- 164.
- LOBO ALLENDE, R., JURI, M. D., BORTNYK, P. Y CHANI, J. M. 2009. *Lista de aves del departamento Chilecito, La Rioja, Argentina*. Ediciones Universidad Nacional de Chilecito.
- LUCERO, F. 2013. Listado de las aves observadas en la Reserva Natural Municipal Articulada: Laguna Guanacache, Laguna del Toro y Bañados del Carau, provincia de San Juan y Laguna Seca y Los Bañados del Tulumaya, provincia de Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (Segunda serie), 137: 1- 16.
- LUCERO, F. H. 2013. *Aves de Sarmiento, provincia de San Juan*. Edición del autor. 1° Edición, Cienaguita. 334 págs.
- LUCERO, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. *Miscelánea*, N° 75. Fundación Miguel Lillo. Tucumán. 61Págs.
- MÁRQUEZ, J. 1999. Las Áreas Protegidas de la provincia de San Juan. Protected areas in San Juan Provincia. *Multequina*, 8: 1- 10.
- MOSCHIONE, F. Y A. L. SUREDA. 2007. *Reserva Provincial Laguna Brava*. En DI GIACOMO, A. S., M. V. DE FRANCESCO Y E. G. COCONIER (editores). 2007. *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*: 255-257. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.
- NAVARRO, C. I., Z. J. BRANDÁN Y N. L. MARIGLIANO. 2007. Lista comentada de las aves de un fragmento de la Reserva Provincial La Florida, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 51 (2): 142- 150.
- NAVAS, J. R. Y A. R. CAMPERI. 2005. Novedades y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves del noroeste de la Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, (n.s.) 7: 77- 82.
- NORES, M. 1995. Insular biogeography of birds on mountain- tops in north western Argentina. *Journal of Biogeography*, 22: 61- 70.
- NORES, M. Y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte III. *Historia Natural*, 2: 151- 152.
- NORES, M. Y M. M. CERANA. 1990. Biogeography of forest relics in the mountains of northwestern Argentina. *Revista Chilena de Historia Natural*, 63: 37-46.
- NORES, M. Y S. A. SALVADOR. 1996. Nuevos registros de aves para San Juan. *Nuestras Aves*, 34: 43- 44.
- OLIVERA, R. A., U. LARDELLI Y F. BRUNO. 2009. *Aves del Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca. Mendoza, Argentina*. Lista Comentada. El Arunco N° 2. Ed. de la Travesía. La Pampa, Argentina.
- OLROG, C. C. 1959. *Las aves argentinas. Una guía de campo*. Instituto Miguel Lillo. Tucumán., 345 págs.
- OLROG, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana*, IX: 1-377, Tucumán.
- OLROG, C. C. 1979. *Nueva lista de la avifauna argentina*. Opera Lilloana, XXVII, 324 págs., Fundación Miguel Lillo, Tucumán.



OLROG, C. C. Y E. A. PESCEITI. 1991. *Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo*. Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Mendoza. 160 págs.

ORTÍZ, G. S. Y C. E. BORCHI. 2007. En: *Diversidad biológica y cultural de los Altos Andes Centrales de Argentina: línea de base de la reserva de la biósfera San Guillermo*. Capítulo 11, Aves. San Juan. 1ª Ed. San Juan: Universidad de San Juan.

ORTÍZ, G. S. Y F. MURÚA. 1994. Aves de ambientes acuáticos de la Provincia de San Juan (Argentina) I. Ciénaga de Zonda, presa embalse Quebrada de Ullum, Arroyo los Tapones y Arroyo del Agua Negra. *Muldequina*, 3: 125-131.

PAYNTER, R. A. Jr. 1995. *Ornithological gazetteer of Argentina*. 2nd. Ed., Cambridge, Massachusetts, 1043 pp.

PEREYRA LOBOS, R. 1998a. *Aporte al conocimiento de la avifauna de la Provincia de San Juan. Reserva natural estricta "El Leoncito"*. Conservando la Naturaleza, Bol. 1 Centro de Naturalistas Sanjuaninos, p. 21-27, San Juan, Argentina.

PEREYRA LOBOS, R. 1998b. *Lista de aves observadas en la laguna del Macho Muerto 4200 mts. Alt. Reserva de la biósfera "San Guillermo" Departamento Iglesias, Provincia de San Juan*. Conservando la Naturaleza, Boletín 1, Centro de Naturalistas Sanjuaninos, p. 17, San Juan.

PEREYRA LOBOS, R. 1999. Aves residentes de invierno, brazo del río San Juan aledaño a la ruta 147, Las Trancas, Departamento 25 de Mayo. *Centro de Naturalistas Sanjuaninos*, Vol. 2: 30-31. San Juan, Argentina.

PERGOLANI DE COSTA, M. J. I. 1975. Los Muscisaxícolas argentinos. Revisión del género *Muscisaxicola* Lafresnaye y D Orbigny, familia Tyrannidae, Orden Passeriformes. *Hornero*, XI (4): 242- 254.

PESCEITI, E. 2005. Lagunas de Guanacache. Págs. 268-269 en: DI GIACOMO, A. S. (ed). *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos

Aires.

REED, C. S. 1916. *Las aves de la provincia de Mendoza*. Museo Educacional de Mendoza, 47 págs., Mendoza.

REED, C.S. 1921. Las aves de caza de la provincia de Mendoza. *Revista Chilena de Historia Natural*, 25: 203-220.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE Y M. RUMBOLL. 2006. *Aves de Sudamérica. Guía de Campo Collins*. 1ª Edición. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. 384 págs. Buenos Aires.

ROIG, V. 1965. Elenco sistemático de mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. *Boletín de Estudios Geográficos*, 49(XII): 175-227.

SANZIN, R. 1918. Lista de aves mendocinas. *Hornero*, I (3): 147-152.

SILVERIO, M. J. Y E. A. FRA. 2009. Comunidad de Verano de las Aves en el Dique Sumampa (Catamarca): Su uso en el diagnóstico del funcionamiento del Ecosistema. *Huayllu-Bios*, 3: 33-51. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- Universidad Nacional de Catamarca.

SOSA, H. J. 1995. Actualización de la lista de avifauna de la Reserva Provincial Laguna Llanquanelo, Malargüe, Mendoza. Presencia estacional, preferencia de hábitat y nidificación. *Muldequina*, 4: 65-75, Mendoza.

SOSA, H. J. 2005. *Aves no passeriformes. Llanquanelo y zonas de influencia. Manual del observador*. 141págs., Edit. Aguirre, Mendoza.

SOSA, H. Y S. VALLVÉ. 1999. Lagunas de Guanacache (Centro-Oeste de Argentina). Procedimiento de inclusión a la Convención sobre Humedales (RAMSAR, 71). *Muldequina*, 8: 71-85.

SPINUZZA, J. 2009. Primer registro del picaflor enano (*Microstilbon burmesteri*) en la provincia de Córdoba. *Nótulas Faunísticas* (Segunda serie), 28: 1- 3.

SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE. 2010. *Áreas Naturales Protegidas: Provincia de San Juan*. 1ª Ed. Gobierno de la provincia de San Juan. 176 págs.



Figura N° 1. Inambú Serrano (*Nothoprocta ornata*) observado el 6 de Octubre de 2014 en el paraje Tres Piedras, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 2. Adultos y juvenil de Macá Grande (*Podiceps major*) observados el 2 de Mayo de 2014 en el dique Cauquenes, departamento Jáchal, provincia de San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.




Figura N° 3. Adulto y joven de Macá Grande (*Podiceps major*) observados en Jocolí, departamento Lavelle, provincia de Mendoza el 26 de diciembre de 2014. Fotografía: Francisco Lucero.




Figura N° 4. Pareja de Jote Real (*Sarcoramphus papa*) fotografiados el 4 de agosto de 2014 en el paraje Santa Gema, departamento Valle Fértil provincia de San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 5. Pareja de Chajá (*Chauna torquata*) observados el 4 de enero de 2015 en el dique Los Sauces, departamento Sanagasta, provincia de La Rioja. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 6. Cisne de Cuello Negro (*Cignus melanophaius*) observado el 22 de marzo de 2015 próximo al paraje Cortaderas, departamento Tinogasta, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 7. Pareja de Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*) observados el 22 de marzo de 2015, en Cortaderas, departamento Tinogasta, provincia de Catamarca. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 8. Garza Mora (*Ardea cocoi*) observada el 20 de marzo de 2012, en el dique Chañarmuyo, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 9. Mirasol Común (*Ixobrychus involucris*) observado el 29 de febrero de 2012 en la localidad de Angulos, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 10. Tero Serrano (*Vanellus resplendens*) observado el 7 de octubre de 2011, en el paraje Tres Piedras, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.




Figura N° 11. Pareja de Pato Zambullidor Chico (*Oxyura vittata*) observados el 20 de febrero de 2010, en el dique Chañarmuyo, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 12. Carau (*Aramus guarauna*) observado el 9 de enero de 2011 en la localidad de Patquía, departamento Independencia, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 13. Juveniles de Jacana (*Jacana jacana*) observados el 28 de abril de 2015 en la localidad de Angulos, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 14. Pareja de Pollona Negra (*Gallinula galeata*) observadas el 11 de octubre de 2014 en la localidad de Angulos, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 15. Pollona Pintada (*Gallinula melanops*) observada el 6 de abril de 2012 en la localidad de Cortaderas, departamento Tinogasta, provincia de Catamarca. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 16. Pollona Pintada (*Gallinula melanops*) observada el 20 de junio de 2012 en la localidad de Alpasinche, departamento San Blas de Los Sauces, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.




Figura N° 17. Adulto y pollo de Gallineta Común (*Pardirallus sanguinolentus*) observados el 31 de octubre de 2011, en la localidad de Angulos, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.




Figura N° 18. Juvenil de Pollona de Escudete Rojo (*Fulica rufifrons*) observado el 4 de enero de 2015 en el dique Los Sauces, departamento Sanagasta, provincia de La Rioja. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 19. Agachona de Collar (*Thinocorus orbignyianus*) observada el 28 de octubre de 2014 en el paraje Tres Piedras, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 20. Pareja de Agachona Grande (*Attagis gayi*) observada el 25 de abril de 2013 en el Portezuelo de Illanes, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 21. Esparvero C6mun (*Accipiter erythronemius*) aliment6ndose de un peque6o passeriforme, observado el 12 de octubre de 2014 en el paraje Las Talas, departamento Chilecito, provincia de La Rioja. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 22. Vencejo de Collar (*Streptoprogne zonaris*) observado a junto a decenas de ejemplares el 8 de enero de 2015 sobre la ruta nacional N°40, departamento Santa María, provincia de Catamarca. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 23. Vencejo Pardo (*Cypseloides rothschildi*) observado el 6 de enero de 2015 sobre la localidad de Tafí del Valle, departamento homónimo, provincia de Tucumán. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 24. Colibrí Grande (*Colibri coruscans*) observado el 9 de enero de 2015 a orillas del Río Amarillo, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 25. Picaflor Enano (*Microstilbon burmeisteri*) ejemplar hembra, observado alimentándose en flores de Liga (*Ligaria cuneifolia*) el 26 de abril de 2015 en la localidad de Cienaguita, departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 26. Vista desde atrás, se observa el detalle de las timoneras ocre acanelado con banda subterminal negruzca. Picaflor Enano (*Microstilbon burmeisteri*) hembra observada el 26 de abril de 2015 en Cienaguita, Sarmiento, San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.




Figura N° 27. Durmilí (*Nystalus maculatus*) observado el 5 de abril de 2015 en el paraje Santa Gema, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 28. Mosqueta de Ojos Dorados (*Hemitriccus margaritaceiventer*) observada el 15 de noviembre de 2014, camino a el paraje Los Bretes, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 29. Dormilona de Cara Negra (*Muscisaxicola maclovianus*) observada el 24 de agosto de 2011 en la localidad de Angulos, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 30. Doradito Pardo (*Pseudocolopteryx dinelliana*) observado el 31 de agosto de 2014 en el Bañado del Carau departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 31. Payador Canela (*Diglossa sittoides*) observado el 16 de enero de 2015 en el paraje Cueva de Noroña, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.




Figura N° 32. Pecho Colorado (*Sturnella superciliaris*) observado el 26 de julio de 2011 en la localidad de Famatina, departamento Famatina, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.



Figura N° 33. Ejemplar macho de Volatinero (*Volatinia jacarina*) observado el 2 de febrero de 2015 en la localidad de Cienaguita, departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 34. Negrillo (*Sporagra atrata*) ejemplar observado el 3 de febrero de 2011 en el paraje Las Placetas, departamento Chilecito, provincia de La Rioja. Fotografía: Federico Izasa.

Recibido: 30 de abril de 2015
Aceptado: 16 de agosto de 2015