ecoregistros.com.ar
Registros Ecológicos de la Comunidad

ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo Nº 15 - 2011

SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LA NIDIFICACIÓN MÁS AUSTRAL DE LAVANDERA (*Arundinicola leucocephala*)

Alec Earnshaw, Jorge La Grotteria, Hernán Alvarado y Diego Oscar

La Lavandera (*Arundinicola leucocephala*) posee un marcado dimorfismo sexual: el macho es negro con capuchón blanco y naranja en mandíbula, mientras que la hembra posee dorsal pardusco con frente y ventral blancuzcos (Narosky e Yzurieta, 2010). Los juveniles son similares a las hembras.

Habita en sabanas inundadas, juncales, esteros y lagunas (Narosky e Yzurieta, 2010) en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes (Olrog, 1979), Tucumán (Toranzo, 1989), Misiones (Chebez, 1996), Entre Ríos (De la Peña, 1997) y Buenos Aires (Maugeri y Montenegro, 2002).

En Entre Ríos fue observada en el departamento La Paz (De la Peña, 1997). En la provincia de Buenos Aires se encuentra registrada en un juncal en el partido de Ramallo, en el nordeste de la provincia en dos años consecutivos (Maugeri y Montenegro, 2002).

En Narosky y Salvador (1998) se comenta la observación de M. de la Peña de tres nidos en Santa Fe construidos sobre Junco (*Schoenoplectus californicus*) y Duraznillo (*Solanun glaucophyllum*). Luego se citaron cuatro nidos para Santa Fe (De la Peña, 2005) de los cuales tres eran los mencionados por Narosky y Salvador (1998).

Anteriormente se encontraba ubicada en el género *Fluvicola*; actualmente se encuentra en el género monotípico *Arundinicola* lo cual vuelve aún más importante su conservación (Chebez, 2009).

El 7 de agosto del 2010 A. Earnshaw avistó una pareja de Lavandera instalada en una zanja con agua y vegetación palustre en Ceibas, Entre Ríos (33° 29' 53,01" S; 58° 47' 46,90" O).

El 28 de agosto del 2010, J. La Grotteria, D. Oscar, H. Alvarado y Esteban Argerich, observaron en el mismo lugar un ejemplar macho muy confiado (Figura N° 1) que curiosamente se acercaba a los observadores. Se alimentaba cazando insectos sobre el suelo y se posaba sobre un alambrado. Constantemente realizaba una vocalización de llamado.

El 3 de octubre del 2010 J. La Grotteria observó a la pareja con indicios de anidar, recolectando pastos secos que había sobre un alambrado. La hembra se comportaba de manera muy confiada, y en cambio esta vez el macho conservaba una notable distancia.

El 9 de octubre del 2010 *A.* Earnshaw observó un posible prototipo de nido (Figura N° 2). Consistía de un tejido ligero de fibras vegetales y hebras blancas (posiblemente

telas de araña) colocadas a media altura en un Duraznillo que crecía junto a un poste del alambrado. Durante la observación matinal la hembra se acercó frecuentemente a la construcción, sin aportar material. Al regresar al sitio esa misma tarde el tejido había desaparecido. Es posible entonces que haya decidido mudar un nido incipiente, que se trate de material acaparado para una construcción futura, o simplemente material acumulado por el viento u otros agentes.

El 31 de octubre del 2010 se observó nuevamente a la pareja. La hembra se comportaba de manera muy confiada mientras que el macho solo se dejaba ver de lejos y se lo notaba muy asustadizo.

El 14 de noviembre de 2010 Guillermo Terán y Andrés Terán hallaron el nido de las lavanderas (Figuras N° 3 y 4) dentro de un Espinillo (*Acacia caven*) de pequeño porte. Se encontraba muy expuesto a la vera de un camino vecinal por el cual transitaban unos pocos vehículos. El nido construido era una tacita techada hecha de pastos y muchas plumas y estaba ubicado cerca del extremo de una rama baja, a algo más de medio metro por encima de la vegetación flotante del bañado.

El 23 de diciembre del 2010 E. Argerich observó a la pareja junto a dos volantones (Figura N° 5, donde se aprecia a la hembra adulta detrás de los mismos) alimentándose en los alambrados cercanos. Ambos adultos se encontraban cazando alguaciles para alimentar a sus pichones.

El 9 de enero del 2011 H. Alvarado concurre nuevamente al sitio de nidificación y pudo observar a todo el grupo familiar cazando activamente insectos sobre el agua y la vegetación flotante. Luego de períodos de caza en espacios abiertos, regresaban a descansar a un pirizal ubicado a orillas del camino. Por los rasgos del plumaje que tenían en ese momento los pichones eran fácilmente confundibles con la madre.

En una visita al sitio el 24 de enero de 2011 y subsiguientes, A. Earnshaw ya no observó presencia de la especie.

Con este seguimiento de nidada de Lavandera registramos la nidificación más austral para la especie.

AGRADECIMIENTOS

A Guillermo Terán, Andrés Terán y Esteban Argerich por su colaboración con observaciones de campo y registros fotográficos.

BIBLIOGRAFÍA

CHEBEZ, J. C. 1996. Fauna misionera. Catálogo Sistemático y Zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones (Argentina). Monogr. LOLA Nº 5. 318 págs., Buenos Aires.

CHEBEZ, J. C. 2009. Otros que se van. Fauna Argentina Amenazada. 552 págs. Albatros. Buenos Aires.

DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monogr. LOLA Nº 15. 138 pág., Buenos Aires.

DE LA PEÑA, M. R. 2005. Reproducción de las aves argentinas (con descripción de pichones). Monogr. LOLA Nº 20. 845 pág., Buenos Aires.

MAUGERI, F. G. Y M. J. MONTENEGRO. 2002. Tres nuevas citas de aves para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 43:21-22, Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total. 16a ed. 427 págs. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

NAROSKY, T. Y S. SALVADOR. 1998. Nidificación de las aves argentinas: Tyrannidae. Asoc. Ornit. Del Plata. 135 págs. Buenos Aires, Argentina.

OLROG, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana XXVII, 324 págs. Fund. M. Lillo, Tucumán.

TORANZO, L. A. 1989. Nueva especie para Tucumán. Nuestras Aves, 18:10.

ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo Nº 15 - 2011

Figura N° 1. Macho de Lavandera (*Arundinicola leucocephala*) en Ceibas el 28/08/2010. Fotografía: Jorge La Grotteria.

ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo Nº 15 - 2011

Figura N° 2. Hembra de Lavandera junto a un supuesto prototipo de nido, en Ceibas el 09/10/2010. Fotografía: Alec Earnshaw.

ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo Nº 15 - 2011

Figura N° 3. Hembra de Lavandera (*Arundinicola leucocephala*) en el nido, Ceibas, 14/11/2010. Fotografía: Guillermo Terán.

ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo Nº 15 - 2011

Figura N° 4. Hembra de Lavandera (*Arundinicola leucocephala*) fuera del nido, Ceibas, 14/11/2010. Fotografía: Andrés Terán.

ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo Nº 15 - 2011

Figura N° 5. Juveniles junto a hembra de Lavandera (*Arundinicola leucocephala*) en Ceibas el 23/12/2010. Fotografía: Esteban Argerich.