ISSN 2250-6233

ecoregistros.com.ar
Registros Ecológicos de la Comunidad

ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 4 - 2012

NUEVO REGISTRO DE VIUDITA ENMASCARADA (*Fluvicola nengeta*) EN ARGENTINA

Jorge La Grotteria[1], Ramón Moller Jensen[2] y Hernán Alvarado[3]

[1] Correo electrónico: jorgelg21@hotmail.com
[2] Correo electrónico: monrajen@yahoo.com.ar
[3] Correo electrónico: hernalvarado@yahoo.com.ar

De aspecto muy llamativo, la Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) presenta patas, alas y pico negros; iris oscuro, cola negra con el extremo blanco ensanchándose hacia los laterales, banda negra que nace en el pico, atraviesa el ojo y culmina levemente curvado hacia abajo en su parte posterior; espalda de color gris pálido y el resto del cuerpo blanco; la hembra y el macho son similares (Sick, 1985; Krauczuk *et al*., 2003; Del Hoyo *et al.*, 2004).

Se conocen dos subespecies, la *F. n. atripennis* que habita en una pequeña zona al oeste del Ecuador desde el sur de la localidad de Esmeraldas hasta el extremo noroeste de Perú (Del Hoyo *et al.*, 2004) y la *F. n. nengeta*, que nos convoca para este trabajo. Esta última se encuentra en creciente expansión, se distribuye típicamente por el nordeste de Brasil (Sick, 1985) y ha realizado un notable desplazamiento hacia el sur, hasta observarse ya en la década de 1950 en Río de Janeiro (Sick, 1985), luego en São Paulo en 1980 (Willis, 1991), 1985, 1986 y 1987 (Alvarenga, 1990), llegando al estado de Paraná (Scherer Neto y Carrano, 1998). También se la ha detectado recientemente en Paraguay (Klavins y Bodrati, 2007). Cuenta con escasas apariciones en Argentina, por lo que se considera una especie rara o accidental (Chebez, 2009). Fue registrada en el sector parquizado del destacamento de guardaparques del Parque Provincial Esmeralda, Reserva de Biósfera Yaboty, departamento de San Pedro, Misiones, el 20 de marzo de 2002 por el guardaparques Daniel Kurday (Krauczuk *et al*., 2003). Luego fue registrada en el sector parquizado que rodea las viviendas del Parque Provincial Moconá, departamento de San Pedro, Misiones, el 19 de octubre de 2005 por Alejandro Bodrati (Klavins y Bodrati, 2007). Además en el Parque Nacional Iguazú, departamento Iguazú, Misiones, el 17 de febrero de 2010 por Eduardo Militello (Militello *et al.*, 2010).

Aquí presentamos nueva información de la especie dentro de Argentina.

El 18 de febrero de 2012 en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva (25º 51' 16.32" S; 53º 58' 19.74" O), departamento General Belgrano, Misiones, observamos y fotografiamos un ejemplar de Viudita Enmascarada que se encontraba corriendo y cazando insectos en el piso en las orillas del dique perteneciente a dicha reserva. Luego se posó sobre una mata (Figura N° 1) y voló

ISSN 2250-6233

Figura N° 1. Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva el 18/02/2012. Fotografía: Jorge La Grotteria.

para la zona más pantanosa. Allí siguió con la misma actividad de cacería de insectos en el piso en las orillas barrosas del pantano y vegetación acuática, hasta que la perdimos de vista. Este comportamiento coincide con el mencionado por Marcia y Daniel Kurday en Chebez (2009), donde comparan el parecido del comportamiento con el de un Picabuey (*Machetornis rixosus*), también coincidente con lo expuesto en Klavins y Bodrati (2007), como también en Militello *et al.* (2010) donde se comenta que su comportamiento recuerda al Picabuey con un caminar más acelerado.

El 20 de febrero en la misma reserva, Jorge La Grotteria vuelve a registrar el ejemplar pero esta vez en un arroyo alimentado por el dique, luego del lago inferior, unos 300 mtrs al nordeste, junto a un Pitotoy Solitario (*Tringa solitaria*) y un Picabuey (*Machetornis rixosus*).

El 22 de febrero Natalia Germain y Ramón Moller Jensen vuelven a registrar el ejemplar (Figuras N° 2 y 3), esta vez bien cerca del

ISSN 2250-6233

Figuras N° 2 y 3. Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva el 22/02/2012. Fotografías: Ramón Moller Jensen.

ISSN 2250-6233

quincho de la reserva y luego más tarde fue registrado en el mismo lugar que el 20 de febrero llevando un plumón en el pico para un área cerrada de árboles.

El 23, 24 y 29 de febrero R. Moller Jensen y N. Germain la vuelven a observar y también la escucharon vocalizar. Cada vez más confiada, se acerca a las edificaciones de la reserva.

El 22 de marzo Daniela Espinosa, junto a R. Moller Jensen y N. Germain pudo observar y fotografiar (Figura N° 4) al ejemplar en el arroyo cercano al dique, perchado en una cerca próxima. Luego bajó a orillas del arroyo buscando insectos en el barro y permaneció caminando en esa tarea durante varios minutos antes de volar.

La Reserva Privada San Sebastián de la Selva forma parte del Corredor Biológico Urugua-í – Foerster. Este es considerado un Área Importante para la Conservación de las Aves o AICA, une al Parque Provincial Urugua-í con el P. P. Horacio Foerster y permite conexión de cubierta nativa entre ellos (Rey, 2007). La reserva se encuentra en un lugar privilegiado, con selva y partes de césped abiertos que son los sitios que frecuenta la Viudita Enmascarada.

Figura N° 4. Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva el 22/03/2012. Fotografía: Daniela Espinosa.

ISSN 2250-6233

Esta especie se ve favorecida por la alteración humana a los ambientes, como ha sido demostrado en cada uno de los trabajos citados sobre su expansión. De la misma manera, desde ya hace un tiempo, se encuentran en la reserva otras especies de reciente expansión favorecidas por la deforestación en las selvas, como la Mosqueta Pico Pala (*Todirostrum cinereum*), citada por primera vez para Argentina en Bosso (2001), ya nidificante dentro de la reserva; y la Torcacita Escamada (*Columbina squammata*), frecuente de oír y observar en el lugar (Moller Jensen, obs. pers.).

Se adicionan nuevos registros documentados de un ejemplar de Viudita Enmascarada en Argentina. En todas las fotografías se puede observar que el ejemplar se encuentra en medio de una muda de plumaje y el patrón de plumas viejas/nuevas es concordante, por lo que no hay dudas de que se trata del mismo ejemplar. Este es el primer ejemplar registrado y documentado dentro de Argentina que mantiene permanencia de más de un mes dentro de la misma área de observación original, y hasta la actualidad. Además, es el primer registro para el departamento General Belgrano y por ende para el Corredor Biológico Urugua-í - Foerster.

AGRADECIMIENTOS

A Natalia Germain por la compañía y la información brindada de sus observaciones, y a Daniela Espinosa por la fotografía, información de sus observaciones y aporte brindado para este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

ALVARENGA, H. M. F. 1990. Novos registros de expansões geográficas de aves no leste de estado de São Paulo. Revista Brasileira de Ornitologia, Ararajuba 1: 115-117.

BOSSO, A. 2001. *Todirostrum cinereum* (Tyrannidae), una nueva especie para la avifauna argentina. *Hornero*. 16(1): 49-50.

CHEBEZ, J. C. 2009. *Otros que se van. Fauna argentina amenazada*: 264-265 y 414 págs. Editorial Albatros, Buenos Aires.

DEL HOYO, J., A. ELLIOT Y J. SARGATAL (eds.). 2004. *Handbook of the birds of the world, Vol. 9, Cotingas to Pipits and Wagtails*. 863 págs., Birdlife International y Lynx, Barcelona.

KLAVINS, J. Y A. BODRATI. 2007. La Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*): una nueva especie para Paraguay y segundo registro para Argentina. *Hornero*. 22 (1): 43-45, Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

KRAUCZUK, E. R., D. KURDAY Y E. ARZAMENDIA. 2003. Presencia de *Fluvicola nengeta* en la provincia de Misiones, Argentina. *Lundiana*. 4 (2): 161, Instituto de Ciencias Biológicas-UFMG.

MILITELLO, E., J. C. CHEBEZ Y I. DA COSTA BUENO. 2010. Nuevo registro de la Viudita de Antifaz (*Fluvicola nengeta*) (Passeriformes: Tyrannidae) para la Argentina. *Nótulas Faunísticas*. 44: 1-4. Segunda serie. Fundación Félix de Azara, Buenos Aires.

REY, N. 2007. Corredor Urugua-í-Foerster. En DI GIACOMO, A. S., M. V. DE FRANCESCO Y E. G.

ISSN 2250-6233

COCONIER (editores). 2007. *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 284-286. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

SCHERER NETO, P. Y E. CARRANO. 1998. Ocorrencia da lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta* (Linnaeus,1766) no Estado do Paraná. Atualidades Ornitológicas. (82):11.

SICK, H. 1985. *Ornitologia Brasileira, uma introdução*. Volumen I: 478 págs y volumen II: 827 págs. Edit. Univers. De Brasilia. Brasilia.

WILLIS, E. O. 1991. Expansão geográfica de *Netta erythrophthalma*, *Fluvicola nengeta* e outras aves de zonas abertas com a "desetificação" antrópica. *Ararajuba*. 2: 101-102.