



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 16 - 2012

UN NUEVO PICAFLOR PARA LA PROVINCIA DE SAN JUAN, EL PICAFLOR VIENTRE BLANCO (*Amazilia chionogaster*) Y NUEVAS LOCALIDADES EN LA DISTRIBUCIÓN PARA OTRAS AVES

Francisco Lucero¹

¹ Correo electrónico: francilucero@hotmail.com

La familia Trochilidae está representada hasta el momento por nueve especies en la provincia de San Juan, ellas son el Picaflor Andino (*Oreotrochilus leucopleurus*) (Navas, 1968), Picaflor Puneño (*Oreotrochilus estella*) (Chebez *et al.*, 1998; Chebez, 2005; Ortíz y Borghi, 2007), Colibri Grande (*Colibri coruscans*) (Olrog y Pescetti, 1991; Gelain y Pereyra Lobos, 2011), Picaflor de Barbijo (*Heliomaster furcifer*) (Lucero, 2012), Picaflor Rubí (*Sephanoides sephaniodes*) (Lucero, 2009), Picaflor Común (*Chlorostilbon lucidus*), un ejemplar colectado por Zotta y Aiello en 1940, depositado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, mencionado en Camperi y Darrieu (2004), Picaflor Bronceado (*Hylocharis chrysura*) (Lucero, 2009), Picaflor Gigante (*Patagona gigas*) (Contreras, 1978) y Picaflor Cometa (*Sappho sparganura*) (Camperi y Darrieu, 2004). Se da a conocer en este trabajo el primer registro del Picaflor Vientre Blanco (*Amazilia chionogaster*) y como complemento se mencionan nuevas localidades para el Picaflor de Barbijo, la Choca Común (*Thamnophilus caurescens*) y el Pitiayumí (*Parula pitiayumi*).

Picaflor Vientre Blanco (*Amazilia chionogaster*)

El Picaflor Vientre Blanco presenta un ventral blanco uniforme y característico de la especie. El dorso es de color verde bronceado opaco, su cola verdosa con un leve ápice blanco, tiene un pico casi recto de color negro y la mandíbula roja (Narosky e Yzurieta, 2010). Su distribución conocida en Argentina se extiende por las provincias de

Salta (Camperi, 1990), Jujuy (Fiora, 1933; Salvador, 1988), Tucumán (Hartert y Venturi, 1909; Handford, 1983), Santiago del Estero (Nores e Yzurieta, 1981), Catamarca (White, 1882; Salvín, 1982) y La Rioja (Koslowsky, 1895; Giacomelli, 1923; Salvador, 1992), habitando yungas y bosques (Narosky e Yzurieta, 2010). De la Peña (2012) incluye a la provincia de Formosa en su distribución mencionando la cita de Esteban (1953).

El 8 de octubre de 2012, en el paraje Las Tumanas, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan (30° 51' 54" S; 67° 19' 23" O), se observa un ejemplar de Picaflor Vientre Blanco alimentándose en las flores de un Palán Palán (*Nicotiana glauca*) a orillas del arroyo que atraviesa la ruta provincial Nº 150, se lo observó por alrededor de veinte minutos ir y venir nuevamente para alimentarse (Figura Nº 1). Luego a 10 km al sur en la localidad de Astica, departamento Valle Fértil (30° 57' 11" S; 67° 18' 18" O), se escucharon vocalizar tres ejemplares de este picaflor, pudiendo lograr fotografías de uno de ellos (Figura Nº 2), hallándose en formaciones boscosas ribereñas acompañando cursos de agua, compuestas por talas (*Celtis tala*), algarrobos (*Prosopis* sp.) y formaciones de Palán Palán. El Picaflor Vientre Blanco no ha sido mencionado en trabajos anteriores (Olrog y Pescetti, 1991; Camperi y Darrieu, 2004; Gelain y Pereyra Lobos, 2011), en consecuencia estos son los primeros registros para la provincia de San Juan y los más australes de su geonemia agregando una décima especie de trochílido a las ya mencionadas especies sanjuaninas.



ECOREGISTROS REVISTA N° 2 - Artículo N° 16 - 2012



Figura N° 1. Picaflor Vientre Blanco (*Amazilia chionogaster*) registrado el 8 de octubre de 2012 en la localidad Las Tumanas. Nótese caracteres distintivos de las especie, mandíbula roja, mancha postocular blanca, ápice blanco en timoneras. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura N° 2. Picaflor Vientre Blanco (*Amazilia chionogaster*) fotografiado el 8 de octubre en la localidad de Astica. Fotografía: Francisco Lucero.

Picaflor de Barbijo (*Heliomaster furcifer*)

Este llamativo picaflor ha sido recientemente registrado para San Juan en la localidad de Usno, departamento Valle Fértil (Lucero, 2012), donde se observó un ejemplar hembra.

El 8 de octubre de 2012, en la localidad de Astica se visualiza un ejemplar macho, perchado en una rama de un Tala (Figura N° 3). Este nuevo registro ocurre a 50 km al sudeste del anterior mencionado.

Choca Común (*Thamnophilus caerulescens*)

Distribuida ampliamente por el norte de Argentina, en la provincia de San Juan los primeros registros son los realizados en cercanías de la ciudad cabecera Villa San Agustín, Parque Provincial Valle Fértil, departamento Valle Fértil (Lucero y Chebez, 2011).

El 8 de octubre de 2012 se escucha y observa ejemplares de Choca Común en dos nuevas localidades en el mismo departamento. Los sitios puntuales de estos hallazgos corresponden a una quebrada de montaña camino a la localidad de Los Bretes (30° 45' 42" S; 67° 26' 20" O) y en la localidad Las Tumanas (Figura N° 4), distantes del registro anterior respectivamente 15 y 30 km en dirección sureste, siguiendo las serranías con manifestaciones de Chaco Serrano y quebradas húmedas.

Pitiayumí (*Parula pitiayumi*)

El 6 de agosto de 2011 se observó al menos tres ejemplares de este pequeño parúlido en el camping de la localidad de Pedernal (31° 59' 19" S; 68° 44' 20" O), en el departamento Sarmiento, San Juan (Figura N° 5). Se observaron muy asociados a pinares introducidos y al Aguaribay (*Schinus molle*).



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 16 - 2012



Figura Nº 3. Picaflor de Barbijo (*Heliomaster furcifer*), observado el 8 de octubre de 2012 en la localidad de Astica. Se destaca en la imagen del ejemplar la cola furcada, zona ventral azul violáceo y la manchita postocular blanca. Fotografía: Francisco Lucero.



Figura Nº 4. Choca Común (*Thamnophilus caeruleus*), observada en la localidad de Las Tumanas el 8 de octubre de 2012. Se destaca en la imagen, parte de las timoneras escalonadas con ápice blanco, ventral canela y pecho gris. Fotografía: Adriana Sosa.



Figura Nº 5. Ejemplar de Pitiayumí (*Parula pitiayumi*) registrado en la localidad de Pedernal el 6 de agosto de 2011. Fotografía: Francisco Lucero.



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 16 - 2012

Para San Juan se documentó su presencia en Haene (1987). Esta nueva localidad y menciones corresponden a las más australes y occidentales para la provincia de San Juan.

BIBLIOGRAFÍA

CAMPERI, A. R. 1990. Notas sobre una colección de aves del río Santa María, Salta, Argentina. *Hornero*, 13(2): 147-151.

CAMPERI, A. R., Y C. A. DARRIEU. 2004. Avifauna de la provincia de San Juan: lista comentada de especies. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 6: 147-164.

CHEBEZ, J. C. 2005. *Guía de las reservas naturales de la Argentina: Zona Centro*. Editorial Albatros, Buenos Aires.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS Y A. G. DI GIACOMO. 1998. *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA, Buenos Aires.

CONTRERAS, J. R. 1978. Biota centro-andina. VII. Comentarios acerca de las razas del Picaflor gigante *Patagonas gigas*, en las provincias de Mendoza y San Juan (Aves: Trochilidae). *Neotrópica*, 24: 47 – 49.

DE LA PEÑA, M. R. 2012. Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: informe preliminar. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 7, Ediciones Biológica, 770 pp.

ESTEBAN, J. G. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zoológica Lilloana*, 13: 349-362.

FIORA, A. 1933. El peso de las aves. *Hornero*, 5(2): 174-188.

GELAIN, M. A. Y R. PEREYRA LOBOS. 2011. Lista de aves de la provincia de San Juan, Argentina. *Xolmis*, Nº 3. Centro de Registros Ornitológicos (CRO) San Juan, Argentina.

GIACOMELLI, E. 1923. Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la provincia de La Rioja. *Hornero*, 3(1): 66-84.

HAENE, E. H. 1987. Nuevos registros para la avifauna sanjuanina. *Nuestras Aves*, 12: 18-19.

HANFORDT, P. 1983. Breves notas sobre aves de valle de Tafí, provincia de Tucumán. *Neotrópica*, 29: 97-105.

HARTERT, E. Y S. VENTURI. 1909. *Notes sur les oiseaux de la République Argentine*. *Nov Zool*. Vol. XVI. Págs. 159-267.

KOSLOWSKY, J. 1895. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito, La Rioja. *Revista del Museo de La Plata*, 6: 277-287.

LUCERO, F. 2009. Aves nuevas, raras o con pocos registros para las provincias de Mendoza y San Juan. *Nuestras Aves*, 54: 57–62.

LUCERO, F. 2012. Nuevos registros y distribuciones de aves para las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Parte II. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 97.

LUCERO, F. Y J. C. CHEBEZ. 2011. Nuevas citas y ampliación de la distribución de algunas aves en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 71.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

NAVAS, J. R. 1968. Nuevos datos sobre distribución de dos Trochílidos en la Argentina (Aves, Trochilidae). *Neotrópica*, 14: 38-39.



ecoregistros.com.ar
Registros Ecológicos de la Comunidad



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 16 - 2012

NORES, M. Y D. YZURIETA. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. *Historia Natural*, 2: 33-42.

OLROG, C. C. Y E. A. PESSETTI. 1991. *Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo*. Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Mendoza. 160 págs.

ORTÍZ, S. G. Y C. E. BORCHI. 2007. Aves en: Martínez- Carretero E (ed) *Diversidad biológica y cultural de los Altos Andes Centrales de Argentina: línea de base de la Reserva de la Biósfera San Guillermo-San Juan*. 1a Ed. Universidad Nacional de San Juan. Pp. 180-197.

SALVADOR, S. A. 1988. Datos de peso de aves argentinas. *Hornero*, 13(1): 78-83.

SALVADOR, S. A. 1992. Nota sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. Parte II. *Hornero*, 13(3): 242-244.

SALVÍN, O. 1982. *Catalogue of the birds in the British Museum*. Vol. 16. London, XVI, 703 Pp.

WHITE, E. W. 1882. Notes on birds collected in the Argentina Republic. *Proc. Zool. Soc. London*, 50: 591-629.