



**PRIMER REGISTRO DE MACÁ GRIS (*Tachybaptus dominicus*) Y OBSERVACIONES DE MACÁ GRANDE (*Podiceps major*), COSCOROBA (*Coscoroba coscoroba*), CISNE CUELLO NEGRO (*Cygnus melancoryphus*) Y PICAFLOR DE BARBIJO (*Heliomaster furcifer*) PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA**

Francisco Lucero<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ruta N° 901 S/N, Cienaguita (5431), provincia de San Juan, Argentina. Correo electrónico: francilucero@hotmail.com

**Macá Gris (*Tachybaptus dominicus*)**

El Macá Gris es el más pequeño de los seis integrantes de la familia Podicipedidae en Argentina. Posee una coloración que varía de cenicienta a plumiza acentuándose en la cabeza, con iris amarillo y garganta negra en plumaje nupcial (Narosky e Yzurieta, 2010). En reposo, posee un plumaje más deslucido que suele confundirse con el del Macá Pico Grueso (*Podilymbus podiceps*) y el Macá Común (*Rollandia rolland*).

Es una especie que se distribuye ampliamente desde Estados Unidos hasta Argentina (Birdlife International, 2013). En Argentina su distribución abarca las provincias de Jujuy (Chebez *et al.*, 1998; Camperi *et al.*, 2012), Salta (Babarkas *et al.*, 1995; Coconier *et al.*, 2007), Tucumán (Lucero, 1983), Catamarca (Nores e Yzurieta, 1983), Formosa (Wetmore, 1926; Navas, 1993), Chaco (Contreras *et al.*, 1990), Misiones (Narosky, 1983; Bodrati *et al.*, 2010), Corrientes (Narosky, 1983; Chatellenaz *et al.*, 2010), Entre Ríos (Parera, 1988), Santiago del Estero (Nores *et al.*, 1991), Córdoba (Casañas y Cargnelutti, 1997), San Luis (Storer, 1975; Olrog y Pescetti, 1991) y Santa Fe (Giai, 1950; De la Peña *et al.*, 2003; Fandiño y Giraud, 2010; De la Peña, 2011). Recientemente se dieron a conocer las primeras evidencias fotográficas para la provincia de Santa Fe (Leiva *et al.*, 2012). Para Buenos Aires hay escasos registros (Barrios y Moschione, 1991; Preisz, 2011) y Río Negro (Contreras *et al.*, 1980). Algunos autores opinan que los registros al sur del paralelo 29°, son producto de confusiones con juveniles de Macá Común (Nores e Yzurieta, 1983).

El 1 de septiembre de 2012 en el dique de Olta, localidad de Olta, departamento General Belgrano, provincia de La Rioja (30° 38' 10" S; 66° 17' 49" O), se observan dos ejemplares a los que se identificaron

en forma dudosa como Macá Gris. El plumaje, la distancia del observador y las fotografías tomadas no permitían una segura identificación de la especie. El 7 de octubre de 2012 se vuelve al sitio de hallazgo para posibilitar una nueva búsqueda, logrando observar dos ejemplares que permitieron una mejor aproximación e identificación confirmándolos como pertenecientes al taxón mencionado (Figuras N° 1 y 2). El dique de Olta presenta aguas transparentes con extensas formaciones de Lenteja de Agua (*Lemna minor*) rodeado de grandes serranías con bosques de Horco Quebracho (*Schinopsis haenkeana*) y variada vegetación correspondiente al Chaco serrano.

No hay registros previos del Macá Gris para la provincia de La Rioja, las observaciones más próximas corresponden a las realizadas en la localidad de El Bañado, departamento Ancasti, provincia de Catamarca (Nores e Yzurieta, *op. cit.*) y la comentada de la localidad de Concarán, provincia de San Luis (Storer, *op. cit.*).

**Macá Grande (*Podiceps major*)**

El Macá Grande se distribuye ampliamente por el país, Narosky e Yzurieta (2010) mapean su presencia exceptuando las provincias de Misiones y San Juan por todo el territorio de Argentina. De la Peña (2012) detalla citas puntuales para las mismas provincias que Narosky e Yzurieta (*op. cit.*) y además menciona registros para la provincia de San Juan (Ortíz y Murúa, 1994; Gelain y Pereyra Lobos, 2011a, 2011b), en tanto son conocidas recientemente nuevas localidades en Lucero (2012).

El 6 de octubre de 2012 se observa una pareja de Macá Grande en el dique de Anzulón, ubicado en el departamento General Ocampo (30° 51' 42" S; 66° 16' 49" O) y el 7 de octubre de 2012 se observan varios ejemplares (de 4 a 6) en el dique de Olta.



ecoregistros.com.ar  
Registros Ecológicos de la Comunidad



**Figura Nº 1.** Ejemplar de Macá Gris (*Tachybaptus dominicus*) observado el 7 de octubre de 2012 en el dique de Olta provincia de La Rioja. Fotografía: Francisco Lucero.



**Figura Nº 2.** Vista lateral izquierdo del mismo ejemplar de Macá Gris (*Tachybaptus dominicus*) observado el 7 de octubre de 2012, en el dique de Olta. Fotografía: Francisco Lucero.



Camperi *et al.* (2008) en un exhaustivo trabajo de recopilación de citas y estudio de pieles en museos, no hallaron evidencias. Olrog y Pescetti (1991) no lo mapean para La Rioja, en tanto Narosky e Yzurieta (2010) lo mapean sin precisar detalles puntuales. Estas observaciones se realizaron mediante binoculares, sin lograr realizar documentaciones fotográficas, dada la excesiva distancia que los ejemplares mantenían.

#### **Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*)**

El 6 de octubre de 2012, en el dique de Anzulón se observan en la orilla opuesta a la pared del dique a 500 mts aproximadamente del observador, cuatro ejemplares de Coscoroba, la gran distancia y la imposibilidad de acercamiento a los ejemplares no permitió registros fotográficos. No hay evidencias de su registro en la provincia de La Rioja (Olrog y Pescetti, 1991), no es mencionada en Camperi *et al.* (2008) y no hay recopilaciones de citas en De la Peña (2012), sólo es mapeado como de presencia dudosa o circunstancial en Narosky e Yzurieta (2010) sin

detalles. Esta es la primera observación detallada de la presencia del Coscoroba para La Rioja.

#### **Cisne Cuello Negro (*Cygnus melancoryphus*)**

El 7 de octubre de 2012 en el dique de Olta, se observa desde el camping ubicado a orillas del espejo de agua a una distancia aproximada de 250 mts un ejemplar adulto próximo a un islote no permitiendo fotografías. Para La Rioja existe una cita (Giacomelli, 1923) sin precisar detalles puntuales de observación, donde es considerado raro.

#### **Picaflor de Barbijo (*Helimaster furcifer*)**

El 6 de octubre de 2012 a orillas del dique de Anzulón, se observan dos ejemplares machos de Picaflor de Barbijo, alimentándose en flores de Palán Palán (*Nicotiana glauca*), se pudieron obtener fotografías a uno de los ejemplares (Figura N° 3). Existen sólo referencias antiguas de la presencia de este picaflor en La Rioja (Giacomelli, 1905, 1923).



**Figura N° 3.** Picaflor de Barbijo (*Helimaster furcifer*) observado a orillas del dique Anzulón, provincia de La Rioja, el 6 de octubre de 2012. Fotografía: Francisco Lucero.



## BIBLIOGRAFÍA

- BABARKAS, M., J. VEIGA Y F. FILIBERTO. 1995. *Lista sistemática de las aves del parque nacional El Rey, Salta, Argentina*. Monografía 6. L.O.I.A. Buenos Aires.
- BARRIOS, I. Y F. N. MOSCHIONE. 1991. Observación del Macá Gris *Tachybaptus dominicanus* en Berisso, provincia de Buenos Aires. *Garganchillo*, 11: 9.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2013. *Tachybaptus dominicus*. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 17 May 2013.
- BODRATI, A., K. COCKLE, J. M. SEGOVIA, I. ROESLER, J. I. ARETA Y E. JORDÁN. 2010. La avifauna del Parque Provincial Cruce Caballero, provincia de Misiones, Argentina. *Cotinga*, 32: 41-64.
- CAMPERI, A. R., C. A. DARRIEU Y M. JUÁREZ. 2008. Avifauna de la provincia de La Rioja (Argentina): lista comentada de las especies. *Acta zoológica lilloana*, 52 (1-2): 76-97.
- CAMPERI, A. R., C. A. DARRIEU, P. P. GRILLI, F. BURGOS. 2012. Avifauna de la provincia de Jujuy, Argentina: Lista de especies (no passeriformes). *Acta Zoológica Lilloana*, 56 (1-2): 82-140.
- CASAÑAS, H., Y R. CARGNELUTTI. 1997. Registro del Macá gris (*Podiceps dominicus*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves*, 37: 6.
- CHATELLENAZ, M. L., P. D. CANO, C. SAIBENE Y H. A. BALL. 2010. Inventario de las aves del Parque Nacional Mburucuyá (Provincia de Corrientes, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana*, 54(1-2): 139-150.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS Y A. G. DI GIACOMO. 1998. *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA, Buenos Aires.
- COCONIER, E. G., B. LOPÉZ LANÚS, I. ROESLER, F. MOSCHIONE, M. PEARMAN, P. BLENDINGER, A. BODRATI, D. MONTELEONE, H. CASAÑAS, G. PUGNATI Y M. E. ÁLVAREZ. 2007. Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión acambuco. Pp: 32-103. En Coconier, E. G. (ed). *Las aves silvestres de Acambuco, provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación n° 6. Nuestras Aves A.O.P.
- CONTRERAS, J. R., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI Y E. E. UTGES. 1990. *Atlas ornitogeográfico de la provincia del Chaco. República Argentina. I. No passeriformes*. Cuaderno Técnico Félix de Azara N° 1. 164 págs. Corrientes.
- CONTRERAS, J. R., V. G. ROIG Y A. G. GIAI. 1980. La avifauna de la cuenca del río Manso superior y la orilla sur del Lago Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. *Historia Natural*, 1: 41-48.
- DE LA PEÑA, M. R. 2011. *Atlas ornitogeográfico de la Provincia de Santa Fe, Argentina*. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 4. Santa Fe, Argentina. 500pp.
- DE LA PEÑA, M. R. 2012. *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: informe preliminar*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica, 770 pp.
- DE LA PEÑA, M. R., M. MANASSERO, J. L. LÓPEZ Y H. LUNA. 2003. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves*, 45: 32-35.
- FANDIÑO, B. Y A. R. GIRAUDO. 2010. Revisión del inventario de aves de la provincia de Santa Fe, Argentina. *Revista FABICIB*, 14: 116-137.
- GELAIN, M. A. Y R. PEREYRA LOBOS. 2011a. Aves con escasos registros en la provincia de San Juan familias Podicipedidae y Anatidae. *Xolmis*, N° 8. Centro de Registros Ornitológicos (CRO) San Juan, Argentina.
- GELAIN, M. A. Y R. PEREYRA LOBOS. 2011b. Lista de aves de la provincia de San Juan, Argentina. *Xolmis*, N° 3. Centro de Registros Ornitológicos (CRO) San Juan, Argentina.
- GIACOMELLI, E. 1905. Notes systématiques et biologiques sur les colibris de la province de La Rioja (République Argentine). *Anales de la Sociedad Científica Argentina*, 59: 97-112.
- GIACOMELLI, E. 1923. Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la provincia de La Rioja. *Hornero*, 3(1): 66-84.





GIAI, A. G. 1950. Notas de viajes. *Hornero*, 9(2): 121-124.

LEIVA, L. A., P. L. BIERIG, B. FANDIÑO Y A. A. PAUTASSO. 2012. Documentación del Macá Gris (*Tachybaptus dominicus*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 57: 82-84.

LUCERO, F. 2012. Becasa de Mar (*Limosa haemastica*) y Playero Zancudo (*Calidris himantopus*), dos nuevos aportes a la avifauna acuática para la provincia de San Juan y menciones para aves con escasos registros. *EcoRegistros Revista*, 2(12): 1-12.

LUCERO, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. *Miscelánea*, N° 75. Fundación Miguel Lillo. Tucumán. Págs 61.

NAROSKY, S. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero*, 12(2): 122-126.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

NAVAS, J. 1993. *Fauna de agua dulce de la República Argentina*. Vol. 43 Fasc. 1 A Podicipediformes y Pelecaniformes. FECIC. Buenos Aires.

NORES, M. Y D. YZURIETA. 1983. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte V. *Historia Natural*, 3: 159-160.

NORES, M., D. YZURIETA Y S. A. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de aves de Santiago del Estero, Argentina. *Ból, Acad. Nac. Cs. Córdoba*, 59: 157-196.

OLROG, C. C. Y E. A. PESSETTI. 1991. *Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo*. Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Mendoza. 160 págs.

ORTÍZ, G. Y F. MURÚA. 1994. Aves de los ambientes acuáticos de la provincia de San Juan (Argentina) I. *Multequina*, 3: 125-131. Instituto Argentino de investigación de las Zonas Áridas. Mendoza.

PARERA, A. 1988. Nueva localidad para el Macá chico. *Nuestras Aves*, 17: 8-10.

PREISZ, S. 2011. Presencia del Macá Gris (*Tachybaptus dominicus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 56: 11-12.

STORER, R. 1975. The Status of the Leat Grebe in Argentina. *Bull. B.O.C.*, 95(4): 148-151.

WETMORE, A. 1926. Observation of the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. *United States Nat. Mus. Bull.*, 133: 1-448.

Recibido: 19 de octubre de 2012

Aceptado: 7 de abril de 2013