



PRIMERA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL BAILARÍN YUNGUEÑO (*Chiroxiphia boliviana*) EN LA PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA

Adrian Braidotti¹

¹ Av. La Plata 954, Carcarañá (2138), Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: adrianbraido@hotmail.com

El macho adulto de Bailarín Yungueño (*Chiroxiphia boliviana*) es de color mayormente negro con una pequeña cresta frontal, parche rojo en el centro de la corona y el dorso de color azul claro. El iris es de color marrón a marrón rojizo, su pico negro y sus tarsos de color purpúreo. La hembra en cambio tiene el dorso de color verde oliváceo, las remeras y cobertoras amarronadas, y las partes inferiores de un verde más pálido, sobre todo en el vientre. El plumaje de los juveniles no está descrito en la bibliografía, pero se presume que el macho muda con plumajes intermedios como en otras especies del mismo género *Chiroxiphia* (Ridgely y Tudor, 1994; Snow y de Juana, 2016). Habita en yungas y bosques húmedos de los Andes entre los 650 y 2200 m s.n.m., en las provincias de Cusco, Madre de Dios y Puno de Perú hasta el sur de Chuquisaca, Bolivia (Ridgely y Tudor, 1994; Schulenberg *et al.*, 2007; BirdLife International, 2016). Investigadores de CONICET-UNJu citaron recientemente a la especie por primera vez para la Argentina en base a la captura con redes de niebla de un ejemplar juvenil y grabaciones de vocalizaciones de otros cuatro ejemplares dentro de la provincia de Salta, en un ambiente de selva pedemontana dominadas por especies perennifolias (Rivera y Politi, 2015).

El 11 de julio del 2016, a las 10:24 hs pude observar y fotografiar un ejemplar de Bailarín Yungueño (Figuras N° 1 y 2) en el sendero La Lagunita (23° 45' 6,1" S; 64° 50' 58,6" O) del Parque Nacional Calilegua ubicado al sureste de la provincia de Jujuy, Argentina. El ejemplar era un macho inmaduro, con la mayor parte del cuerpo con plumaje de juvenil, mientras que en la cabeza, cuello y pecho ya presentaba la coloración negra y corona roja de adulto (Figura N° 3). Fue visualizado en la copa de un árbol a unos 10 metros de altura aproximadamente, mientras se alimentaba de insectos (Figura N° 4). También lo escuché vocalizar en reiteradas oportunidades. Dicha observación se extendió por unos cinco minutos hasta que el individuo se alejó del lugar. El sitio de observación está ubicado en un sector de selva pedemontana (entre 400 y 700 m s.n.m.), que ocupa el estrato más bajo de las Yungas, dónde se encuentran especies como el Cebil Colorado (*Anadenanthera*

colubrina), Tipa Blanca (*Tipuana tipu*), Lapacho Rosado (*Tabebuia impetiginosa*), Palo Blanco (*Calycophyllum multiflorum*), Cedro Colla (*Cedrela lilloi*), Quina (*Myroxylon peruiferum*), Afata (*Cordia trichotoma*), Palo Lanza (*Patagonula americana*) y Urundel (*Astronium urundeuva*).

Este trabajo resulta ser una nueva mención del Bailarín Yungueño dentro de Argentina y el primer registro con evidencia fotográfica para la provincia de Jujuy.

AGRADECIMIENTOS

A Jorge La Grotteria y Pablo Eguia que colaboraron desinteresadamente con este trabajo, a Sergio Cusano, Pablo Meoniz y Diego Oscar que participaron en la identificación del ejemplar, y a Francisco Lucero y Daniela Espinosa por las recomendaciones en el armado del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2016. Species factsheet: *Chiroxiphia boliviana*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 12/08/2016.
- RIDGELY, R. Y G. TUDOR. 1994. *The birds of South America*. Volume II. The Suboscine Passerines. University of Texas Press, Texas.
- RIVERA, L. Y N. POLITI. 2015. El Bailarín Yungueño (*Chiroxiphia boliviana*), nueva especie para Argentina. *Hornero*, 30(1): 21–23.
- SCHULENBERG, T. S., D. F. STOTZ, D. F. LANE, J. P. O'NEILL Y T. A. PARKER III. 2007. *Birds of Peru*. Princeton University Press, Princeton.
- SNOW, D. Y E. DE JUANA. 2016. Yungas Manakin (*Chiroxiphia boliviana*). In: DEL HOYO, J., A. ELLIOTT, J. SARGATAL, D. A. CHRISTIE Y E. DE JUANA (eds.). *Handbook of the Birds of the*

eco registros EcoRegistros.org Registros Ecológicos de la Comunidad

World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/node/57084> on 12 August 2016).

Recibido: 11 de agosto de 2016
Aceptado: 12 de diciembre de 2016



Figuras N° 1 y 2. Ejemplar macho inmaduro de Bailarín Yungueño (*Chiroxiphia boliviana*) en el sendero La Lagunita del Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina, observado el 11 de julio de 2016. Se puede apreciar sus características tales como la coloración verde olivácea en sus partes inferiores, cabeza y pico corto negros y pecho verde oliváceo salpicado de negro. Fotografías: Adrián Braidotti.



Figura N° 3. Fotografía del Bailarín Yungueño (*Chiroxiphia boliviana*) que permite apreciar parte de la corona roja. Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina, el 11 de julio de 2016. Fotografía: Adrián Braidotti.



Figura N° 4. Bailarín Yungueño (*Chiroxiphia boliviana*) alimentándose con un pequeño insecto, en el sendero La Lagunita del Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina el 11 de julio de 2016. Fotografía: Adrián Braidotti.