eco registros EcoRegistros.org Registros Ecológicos de la Comunidad

PRIMER REGISTRO DE MOSQUETA CEJA AMARILLA (*Capsiempis flaveola*) EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

Maximiliano Darío Sager[1]

[1] Brig. López 1048, Romang (3555), Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: maxsag2004@yahoo.com.ar

La Mosqueta Ceja Amarilla (*Capsiempis flaveola*) se caracteriza por su coloración amarilla en cejas y parte ventral, con la parte dorsal más verdosa. Sus alas son pardas con ribetes amarillos verdosos y posee dos bandas en las cubiertas alares también amarillas. Su pico es negro con la base de la mandíbula más clara. Las patas son de color gris pardo, mismo color que tienen sus iris (de la Peña, 2016). Su ceja es notable y resalta, al igual que su ventral por ser de un color amarillo oro, que se repite en dos filetes en cubiertas. Además, posee cola delgada (Narosky e Yzurieta, 2010).

Estas aves tienen una amplia distribución desde América Central hasta Sudamérica, estando presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela (BirdLife International, 2018; Fitzpatrick, 2018). Las citas de esta especie para nuestro país están dadas para las provincias de Misiones y Corrientes (Narosky e Yzurieta, 2010; de la Peña, 2016). En la provincia de Misiones, es habitual y es donde hay mayor cantidad de citas (de la Peña, 2016). Corrientes cuenta con pocos registros para el nordeste de la provincia, siendo la primera cita la de Giraudo (1996) en Colonia Garabí.

El 12 de junio de 2018 recorriendo un camino que surca el margen oeste del Río Paraná Miní, en la zona del Camping de la ciudad de Villa Ocampo, Santa Fe, Argentina, pude avistar un ejemplar de Mosqueta Ceja Amarilla. De un lado del sendero hay cabañas que se encuentran a la margen del río y del otro lado monte ribereño que da luego lugar a lo que podríamos decir es el paisaje general de la zona, que se caracteriza por una extensa planicie de inundación, parte del valle aluvial del Paraná, donde se observan distintos arroyos y lagunas.

Me adentré en un sector donde predominaban picanillas (*Guadua paraguayana*) y en un pequeño claro algo más iluminado pude ver por unos instantes a un ejemplar de Mosqueta Ceja Amarilla posado sobre un árbol que sobresalía de la picanillas del lugar. Duró muy poco la observación, escasos segundos, hasta que se ocultó.

La Mosqueta Ceja Amarilla no se encuentra citada en ninguno de los trabajos compilatorios de Santa Fe (Niedfeld, 1923; Renard, 1924; Wilson, 1926; de la Peña, 2006, 2011; Luna y Manassero, 2008a, 2008b, 2010; Luna y Manassero, 2012a, 2012b; Manassero y Luna, 2012).

De estas evidencias fotográficas resulta el primer registro de la especie para la provincia de Santa Fe. Como se trata de la observación de un solo ejemplar, no se podría asegurar que la presencia de la especie se ha extendido más allá de su distribución habitual, pero si sería motivo para seguir investigando si es posible que esto esté sucediendo, para lo cual se motivan los trabajos de campo o salidas de observación para relevar la cantidad de ejemplares que se encuentran en la región norte de Santa Fe.

BIBLIOGRAFÍA

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2018 Species factsheet: *Capsiempis flaveola*. Downloaded from http://www.birdlife.org on 19/06/2018.

DE LA PEÑA, M. R. 2006. *Nueva Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. Editorial L.O.L.A., Buenos Aires, Argentina.

DE LA PEÑA, M. R. 2011. *Atlas ornitogeográfico de la Provincia de Santa Fe, Argentina.* Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 4. Santa Fe, Argentina. 500pp.

DE LA PEÑA, M. R. 2016. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Tyrannidae a Turdidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, 21 (1): 1-633.

FITZPATRICK, J. 2018. Yellow Tyrannulet (*Capsiempis flaveola*). En: DEL HOYO, J., A. ELLIOTT, J. SARGATAL, D. A. CHRISTIE Y E. DE JUANA. (eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from

eco registros EcoRegistros.org Registros Ecológicos de la Comunidad

https://www.hbw.com/node/57187 on 19 June 2018).

GIRAUDO, A. R. 1996. Adiciones a la avifauna de la provincia de Corrientes, Argentina y de zonas limítrofes del Paraguay. *Facena*, 12: 49-53.

LUNA, H. Y M. MANASSERO. 2008a. Nuevos registros de aves para Santa Fe y Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 53: 12-13.

LUNA, H. Y M. MANASSERO. 2008b. Nuevos Registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte III. *Nuestras Aves,* 53: 42-43.

LUNA, H. Y M. MANASSERO. 2010. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte V. *Nuestras Aves*, 55: 30-33.

LUNA, H. Y M. MANASSERO. 2012a. Registros de aves en bosques de quebrachos del dorso occidental subhúmedo de Santa Fe, Argentina. *Biológica*, 15: 64-70.

LUNA, H. Y M. MANASSERO. 2012b. Primeros registros documentados y evidencia actual para aves de Santa Fe, Argentina. *Biológica*, 15: 74-78.

MANASSERO, M. Y H. LUNA. 2012. Registros documentados y evidencia actual para aves en el nordeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. *Biológica*, 15: 94-100.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina y Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

NIEDFELD, G. 1923. Nombres vulgares de algunas aves de Santa Fe. *Hornero,* 3(2): 187-189.

RENARD, A. 1924. Notas sobre aves de la provincia de Santa Fe. *Hornero,* 3(3): 286-287.

WILSON, A. S. 1926. Lista de aves del sur de Santa Fe. *Hornero*, 3(4): 349-363.

Recibido: 20 de junio de 2018
Aceptado: 28 de octubre de 2018

Figura N° 1. Mosqueta Ceja Amarilla (*Capsiempis flaveola*) en el margen oeste del Río Paraná Miní, en la zona del Camping de la ciudad de Villa Ocampo, Santa Fe, Argentina, el 12 de junio de 2018. Fotografía: Maximiliano Darío Sager.