



PRIMEROS REGISTROS DEL MILANO BOREAL (*Ictinia mississippiensis*) PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Nicolás Olejnik¹, Luis Prevedel² y Soledad Tessore²

¹ Taller de Desarrollo de Técnicas Paleontológicas. Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, Buenos Aires, Argentina.

nicolasolejnik@yahoo.com.ar

² Área Natural Protegida “Don Sebastián” Ruta Provincial 49 s/n – Paraje Tacuaras Ombú – CP3190. La Paz, Entre Ríos, Argentina.

El Milano Boreal (*Ictinia mississippiensis*) es un ave rapaz mayormente gris, con dorso plumizo, que presenta primarias negras, ápice de remeras internas blancuzco y cola negra sin barras. El ventral del juvenil es manchado de castaño y su cola barrada (Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Narosky e Yzurieta, 2010). Es monotípica y se la considera cercanamente emparentada con el Milano Plumizo (*Ictinia plumbea*), siendo ambas especies tratadas, a veces, como conespecíficas (White y Marks, 2017). Captura libélulas, termitas y otros grandes insectos en vuelo, además de alimentarse de aves y mamíferos (de la Peña, 2016).

La especie nidifica en Norteamérica, migrando durante el invierno boreal a través de Centroamérica y Sudamérica, alcanzando el noreste de Argentina (Birdlife International, 2017). Habita sabanas y bosques abiertos, generalmente cerca del agua (Narosky e Yzurieta, 2010; de la Peña, 2016). En Argentina la especie cuenta con registros en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires (de la Peña, 2016). La distribución estival frecuente de la especie abarca desde provincia de Córdoba, Santa Fe y Corrientes hacia el norte del país, siendo los registros más australes infrecuentes, como el caso comunicado por Juhant (2010) que se trata de una observación extralimital, donde un ejemplar fue fotografiado en Punta Rasa, Buenos Aires en 2008.

Durante la tarde del día 15 de febrero de 2015, los autores registraron la presencia de una bandada de aproximadamente 40 ejemplares de Milano Boreal volando en círculos en una corriente térmica, en la zona norte del Área Natural Protegida Don Sebastián (30° 23' S; 59° 11' O), la misma se encuentra ubicada en el departamento La Paz, provincia de Entre Ríos. Tras detectar la presencia de la bandada se observó detenidamente el área y se pudo constatar que al menos un ejemplar se encontraba posado sobre las ramas más altas de un árbol seco (Figura N° 1). Al día siguiente, 16

de febrero, se volvió a observar la bandada en la misma área que el día anterior.

Posteriormente a estas observaciones los autores volvieron a registrar una bandada de la especie de 27 ejemplares el día 1 de marzo de 2015 (Figura N° 2). Finalmente en el 2016 Luis Prevedel y Soledad Tessore registraron 2 ejemplares el 7 de febrero, y 11 ejemplares el 10 de marzo.

El Área Natural Protegida Don Sebastián ocupa un área de 1.783 hectáreas, dentro de las cuales se encuentra un mosaico de ambientes del tipo bosque de espinal, ambiente característico del área chaqueña húmeda, con bosques de especies arbóreas nativas combinadas con algunas especies exóticas, zonas de sabanas combinadas con bosques y en menor medida campos de cultivo. Prácticamente la totalidad del área es utilizada para uso ganadero.

La cantidad de ejemplares observados y el hecho de haber realizado registros de la especie durante dos años consecutivos, indicarían que una población de la especie utiliza la zona como área de permanencia durante su migración y descarta la posibilidad de que el registro haya sido accidental. Se considera de importancia dar a conocer estos registros debido a que son los primeros de la especie en cuestión para la provincia de Entre Ríos, ampliando la distribución conocida de la especie en una nueva provincia y dentro de un área natural protegida. Al tratarse de una especie migratoria que realiza grandes desplazamientos se considera probable que se realicen a futuro nuevos registros en otras áreas del norte de la provincia de Entre Ríos, tal vez siguiendo las márgenes del río Guayquiraró.

Anteriormente se registró otra especie nueva para la avifauna de la provincia de Entre Ríos dentro de la misma área protegida (Reales *et al.*, 2015), siendo este aporte el segundo de una especie nueva para la avifauna



provincial, lo que podría indicar la presencia de más especies nuevas en la zona, por lo que se considera importante realizar futuros relevamientos de fauna en el interior y los alrededores del Área Natural Protegida Don Sebastián.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a Jorge La Grotteria, Francisco Lucero y Daniela Espinosa por sus valiosos aportes a este artículo durante la revisión del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2017. Species factsheet: *Ictinia mississippiensis*. Accedido de <http://www.birdlife.org> el 07/10/2017.

DE LA PEÑA, M. R. 2016. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Ciconiidae a Heliornithidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*, 19 (2): 1-436.

JUHANT, M. A. 2010. Austral spring migration counts of raptors in Punta Rasa, Argentina. *Ornitología Neotropical*, 21: 263-270.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

REALES, F., L. PREVEDEL, G. SAVOR Y S. TESSORE. 2015. Primeros registros del Cerquero de Collar (*Arremon flavirostris*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 5(6): 12-14.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE. Y M. RUMBOLL. 2006. *Guía de campo Collins, Aves de Sudamérica, No Passeriformes*. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. 384 págs. Buenos Aires, Argentina.

WHITE, C. M. Y J. S. MARKS. 2017. Mississippi Kite (*Ictinia mississippiensis*). En: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. Y DE JUANA, E. (eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (accedido de <http://www.hbw.com/node/52975> el 7 de octubre de 2017).

Recibido: 2 de enero de 2018

Aceptado: 26 de marzo de 2018



Figura N° 1. Ejemplar inmaduro de Milano Boreal (*Ictinia mississippiensis*) posado sobre las ramas más altas de un árbol seco en el Área Natural Protegida Don Sebastián, Entre Ríos, Argentina, el 15/02/2015. Fotografía: Luis Prevedel.



Figura N° 2. Bandada de Milano Boreal (*Ictinia mississippiensis*) en el Área Natural Protegida Don Sebastián, Entre Ríos, Argentina, el 01/03/2015. Fotografía: Luis Prevedel.