



## PRIMERAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL PLAYERITO ENANO (*Calidris pusilla*) PARA LA PROVINCIA DE CHUBUT, ARGENTINA

Guillermo Rost<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vélez Sarsfield 1466, B° Centro, Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, Patagonia Argentina.

Correo electrónico: guillerost@gmail.com

El Playerito Enano (*Calidris pusilla*) posee un plumaje de reposo sexual con la corona pardo oscura, manchada de blancuzco, frente y cejas notorias blancas, dorso pardo oscuro, con las plumas marginadas de pardo, lomo y supracaudales pardo oscuro, rectrices laterales pardo claro, partes ventrales, desde la barbilla a las subcaudales, incluyendo las tapadas alares, blanco puro, lados del pecho pardo grisáceo, a modo de un inicio de banda pectoral y alas negruzcas con banda blanca. En vuelo presenta rabadilla negra. También presenta iris pardo oscuro, pico corto, recto, sin curva en el ápice de color negro y patas cortas negruzcas con tono verdoso y con palmadura en el tercio basal. El joven es similar al adulto en plumaje invernal. Deja una huella semipalmada (Nores e Yzurieta, 1980; Canevari *et al.*, 2001; Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Narosky e Yzurieta, 2010). Es muy similar al Playerito de Alaska (*Calidris mauri*), siendo este ligeramente más grande y de patas un poco más largas. Además posee el pico más largo que en el caso de las hembras tiene la punta caída en forma característica. También es puntiagudo y, desde arriba, se ve su punta fina. La voz puede ser útil para identificarlo. La misma consiste en un “chit” agudo y más estridente (Jaramillo, 2005). Es indistinguible a larga distancia; sin embargo, el pico del Playerito Enano es totalmente recto, sin la ligera caída de la punta característica de dicha especie (Canevari *et al.*, 2001).

El Playerito Enano habita costas marinas, playas, manglares, lagunas salobres, ciénagas, riberas fluviales (Rodríguez Mata *et al.*, 2006). Es muy manso, confiado, y poco activo. Para alimentarse acostumbra a poner el cuerpo y el pico en una sola línea con una inclinación de 45°, mientras mueve el pico de adelante hacia atrás, en el agua o en el limo, a modo de un émbolo. También picoteando como los otros chorlitos. Se asocia a bandadas de otras especies del género *Calidris* (Nores e Yzurieta, 1980), en grupos de pocos ejemplares (de la Peña, 2016).

Migratorio del Ártico, nidifica en Siberia (Rusia), Alaska (Estado Unidos) y Canadá. Migra por la costa del Océano

Pacífico desde México y por el Océano Atlántico desde las costas del Caribe hasta Argentina (Birdlife International, 2018). Posee tres grupos migratorios claramente diferenciados siendo los del Atlántico los que llegan más al sur en Sudamérica (Canevari *et al.*, 2001).

En Paraguay cuenta con un registro fotográfico reciente de un individuo observado los días 12 y 13 de mayo de 2017 en Laguna Capitán, departamento de Presidente Hayes y además cuenta con observaciones previas de distintos individuos a lo largo del país a partir del año 1920 hasta la fecha (Ríos *et al.*, 2018). En Uruguay es una especie rara que se puede observar a lo largo sus costas y siendo más común hacia el norte (Azpiroz, 2012). En Chile es un visitante estival localmente común del litoral de Arica, siendo más escaso y local por el sur hasta la Araucanía. Accidental hasta Chiloé; también en embalses altoandinos (regiones de Antofagasta, Atacama y Metropolitana) (Couve, *et al.*, 2016). En Argentina es muy difícil de observar (Narosky e Yzurieta, 2010) y existen escasas citas, siendo señalada para la costa atlántica de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, y con registros puntuales para las provincias de Jujuy, La Pampa, Córdoba y las Islas Malvinas (Narosky *et al.*, 1977; Nores e Yzurieta, 1979; Jaramillo, 2000; Woods, 2006; Darrieu *et al.*, 2011; de la Peña, 2016). Chubut ha sido la primera provincia en donde se halló para la Argentina. Seebohm (1887) señala: “Un ejemplar capturado por el Capitán Harrison en el Golfo Nuevo (alrededor de 43° sur) en la costa de Patagonia, que parece ser el límite sur de su rango en la costa este”. Por otro lado Dabbene (1920) menciona: “El único punto en donde esta especie ha sido señalada en la República Argentina es el valle del Río Chubut, Patagonia (Marzo 1876 - H. Durnford)”. Mientras que Nores e Yzurieta (1979) señalan: “Especie citada solamente para Chubut (Golfo Nuevo) en base a un ejemplar capturado en 1888...” sin dar detalles de esa cita, pero que seguramente refiera a la mención de Seebohm (*op. cit.*). Por último, Harris (2008) menciona que es un visitante infrecuente señalando: “Un ave en Punta Tombo, Chubut, en noviembre de 1976”.



La especie se encuentra categorizada como casi amenazada a nivel internacional, debido a distintas amenazas antrópicas tales como alteración del hábitat tanto en áreas de cría e invernada, minería, cambio climático y cacería de aves playeras (Birdlife International, 2018). En Argentina se la considera como no evaluada (MAYDS y AA, 2017).

El 31 de enero de 2018 por la tardecita mientras realizaba observación de aves en los alrededores de la playa de restinga Alí (45° 47' 29,05" S; 67° 24' 16,95" O) ubicada al norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina pude registrar un ejemplar de Playerito Enano. Se lo identificó fácilmente por su menor tamaño, coloración más blanquecina y ceja blanca más notoria que en otros playeros y su pico más pequeño (Figura N° 1). El lugar del registro era una playa arenosa en la cual desembocaba un desagüe con efluentes de agua dulce y se acumularon gran cantidad de algas debido a las fuertes marejadas presentes en los días previos. El ejemplar se pudo visualizar cuando empecé a fotografiar una bandada de Chorlitos Doble Collar (*Charadrius falklandicus*) alimentándose de pequeños invertebrados que se asomaban al bajar la marea y a partir de allí se pudo apreciar la diferencia de coloración y tamaño entre ambas especies. Se encontraba alimentándose de manera activa en el limo siendo de comportamiento algo confiado. Generalmente seguía el movimiento de los chorlitos (Figura N° 2). En uno de los momentos se lo visualizó junto a un Playerito Unicolor (*Calidris bairdii*) (Figura N° 3). A continuación rápidamente se movió un poco más lejos. Después de bajar la marea la bandada se desplazó más adentro de las plataformas de abrasión en dirección sur. En los días siguientes fui a constatar si seguía por el lugar y no fue así ya que igualmente no se visualizaron los chorlitos pero sí en cambio permanecieron los Playeritos Unicolor.

El ejemplar pudo utilizar esta zona como parada migratoria para refugiarse del fuerte viento con ráfagas de 90 km/h que se desarrollaron a partir del 30 de enero finalizando el 1 de febrero. Este registro constituye la primera evidencia fotográfica para la provincia del Chubut y es de gran interés para la Argentina dado la rareza con que se observan ejemplares y el estado de amenaza en que se encuentra a nivel internacional.

#### AGRADECIMIENTOS

A los presentes integrantes en la revisión del artículo que colaboraron de manera activa en todas las dudas y

planteamientos que tuve, a Mariano Costa por complementar la información que fui recopilando de distintas bibliografías, a los integrantes del COA Namco Golfo San Jorge por su apoyo incondicional.

#### BIBLIOGRAFÍA

AZPIROZ, A. 2012. *Aves de las Pampas y Campos de Argentina, Brasil y Uruguay: Una guía de identificación*. 351 págs., Editorial Distal. Nueva Helvecia. Uruguay.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2018. Species factsheet: *Calidris pusilla*. Accedido de <http://www.birdlife.org> el 07/02/2018.

CANEVARI, P., G. CASTRO, M. SALLABERRY Y L. G. NARANJO. 2001. *Guía de los Chorlos y Playeros de la Región Neotropical*. American Bird Conservancy, WWF-US, Humedales para las Américas y Manomet Conservation Science, Asociación Calidris, Santiago de Cali, Colombia.

DABBENE, R. 1920. Notas sobre los chorlos de Norte América que invernán en la República Argentina. *Hornero*, 2(2): 99-128.

DARRIEU, C. A., A. R. CAMPERI, J. J. MACEDA Y F. BRUNO. 2011. Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies (no passeriformes). *Acta Zoológica Lilloana*, 55: 64-108.

DE LA PEÑA, M. R. 2016. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Charadriidae a Trochilidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*, 20 (1): 1- 627.

HARRIS, G. 2008. *Guía de aves y mamíferos de la costa patagónica*. El Ateneo. Buenos Aires.

JARAMILLO, A. 2005. *Aves de Chile*. 240 págs. Editorial Linx edicions. Ingaprint, S. A. Barcelona. España.

JARAMILLO, A. P. 2000. Punta Rasa, South America's first vagrant trap?. *Cotinga*, 14: 33-38.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y AVES ARGENTINA. 2017. *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. Buenos Aires, Argentina.

# eco registros EcoRegistros.org Registros Ecológicos de la Comunidad

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*.

NAROSKY, T., D. YZURIETA Y M. NORES. 1977. Presencia del Chorlito Enano, *Calidris pusilla*, en la Argentina. *Hornero*, 11(5): 433-434.

NORES, M. Y D. YZURIETA. 1979. Aves de costas marinas y de ambientes continentales, nuevas para la provincia de Córdoba. *Hornero*, 12(1): 45-52.

NORES, M. Y D. YZURIETA. 1980. *Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina*. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 235 págs.

RÍOS, S. D., O. BORDÓN, O. RODRÍGUEZ Y L. RECALDE. 2018. Documentación de *Calidris pusilla* (Aves, Charadriidae) en el Paraguay. *Revista del Museo de La Plata*, 3(1): 12-16.

16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE Y M. RUMBOLL. 2006. *Aves de Sudamérica. Guía de Campo Collins*. 1ª Edición. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. 384 págs. Buenos Aires.

SEEBOHM, H. 1887. *The Geographical Distribution of the Charadriidae, or the Plovers, Sandpipers, Snipes and their allies*. London & Manchester, pp. 1-524.

WOODS, R. W. 2006. *Checklist of Falkland Islands Birds*. Consultado de <http://www.falklandislandsholidays.com/docs/FI-BirdsChecklist.pdf> el 31/05/2018.

Recibido: 15 de marzo de 2018

Aceptado: 26 de mayo de 2018



**Figura N° 1.** Ejemplar de Playerito Enano (*Calidris pusilla*) mostrando sus características que permiten una fehaciente identificación (siendo las mismas corona pardo oscura, frente y ceja blanca, dorso pardo oscuro, con las plumas marginadas de pardo, pico corto, recto, sin curva en el ápice de color negro, iris pardo oscuro y patas cortas negruzcas con tono verdoso y con palmadura en el tercio basal) el 31 de enero del 2018. Fotografía: Guillermo Rost.



**Figura N° 2.** Playerito Enano (*Calidris pusilla*) junto a un Chorlito Doble Collar (*Charadrius falklandicus*) juvenil, en los alrededores de la playa de restinga Alí, al norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, el 31 de enero del 2018. Fotografía: Guillermo Rost.



**Figura N° 3.** Playerito Enano (*Calidris pusilla*) junto a un Playerito Unicolor (*Calidris bairdii*) en los alrededores de la playa de restinga Alí, al norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, el 31 de enero del 2018. Fotografía: Guillermo Rost.