



ECOREGISTROS REVISTA - Artículo Nº 6 - 2011

## REGISTRO DE TUQUITO RAYADO (*Empidonomus varius*) EN LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

Pablo Mosto

El Tuquito Rayado (*Empidonomus varius*) es un ave Paseriforme, de la familia Tyrannidae. Mide unos 17 cm. Tiene cabeza negruzca con larga ceja y malar blancos, corona oculta dorada. Dorso negruzco con leve escamado. Rabadilla rufa y Timoneras rufo, diferencia importante con el Benteveo Rayado (*Myiodynastes maculatus*). Ventral blancuzco con grueso estriado pardo, tiene la cabeza y el pico negro más proporcionado que el Benteveo Rayado (Narosky, 2003).

La distribución de la subespecie *varius* (Vieillot, 1818) abarca: Bolivia, sur de Brasil, norte de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Nidifica en Argentina en primavera y verano, y migra hacia el norte en otoño (Narosky, 2003), tiene amplia distribución en Argentina en sabanas arboladas y bosques abiertos, viven en laterales de bosques, claros y formaciones de arboles medianos, pero no muy cerca (Capllonch, 1997). Es tolerante a los cambios de ambientes (Birdlife International, 2011).

En el Checklist de la Reserva Ecológica Costanera Sur (Pugnali, 2006), figura con abundancia Accidental, que según la referencia quiere decir: Especies registradas ocasionalmente, estando a veces fuera de su distribución geográfica habitual o conocida. Incluye migratorios extraordinarios y aves extraviadas. Y su estacionalidad se encuentra

establecida como Ocasional, que quiere decir: Pocos o esporádicos registros sin una periodicidad anual o estacional definida.

El 20 de Agosto de 2009, a las 14 hs. aproximadamente, Mosto P. avistó y fotografió un ejemplar de Tuquito Rayado en la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) (34° 36' 20.13" S, 58° 21' 5.21" O), frente a la Laguna Los Patos, cerca del camino de los Plumerillos.

La fecha de este avistaje corresponde con la fecha de migración de la especie, cuando la especie realiza un desplazamiento hacia el sur.

Se considera importante este registro ya que es muy austral según su distribución geográfica, e incorpora un nuevo registro para el Tuquito Rayado dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con información de su estacionalidad.

### BIBLIOGRAFÍA

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2011. Species factsheet: *Empidonomus varius*. Downloaded from <<http://www.birdlife.org>> on 09/04/2011.

CAPLLONCH, P. 1997. La Avifauna de los Bosques de Transición del Noroeste



Argentino. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán.

FITZPATRICK, J. W. 1980. Wintering of North American tyrant flycatchers in the Neo- tropics. in: Migrant Bird in the Neotropics. A. Keast and E.S. Morton Eds. Smithsonian Institution Press, pp. 67- 78. Washington D.C.

NAROSKY, T. & D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de aves de la Argentina y Uruguay. Edición de oro.

Vázquez Manzini Editores. Buenos Aires, Argentina.

NAROSKY, T. & G. A. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.

PUGNALI, G. Y P. CHAMORRO (compiladores). 2006. Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires.



**Figura 1.** Tuquito Rayado en la RECS. Fotografía: Pablo Mosto

