



ECOREGISTROS REVISTA - Artículo Nº 9 - 2011

NUEVOS REGISTROS DE FIOFÍO SILBÓN (*Elaenia albiceps*) EN LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR, BUENOS AIRES

Marcelo Gavensky

Los miembros del género *Elaenia* son aves passeriformes muy parecidas entre sí, confiadas y pasivas, con pico corto y que poseen un patrón de coloración que en líneas generales comparte la mayoría de sus representantes: corona oculta blanca, dorso pardo oliváceo, filetes blancuzcos en cubiertas y remeras internas, pecho gris, resto ventral amarillento, párpado claro y mandíbula anaranjada (Narosky & Yzurieta, 2010). El Fiofío Silbón (*Elaenia albiceps*) posee sin embargo algunas características que lo distinguen claramente de otras especies presentes en el área (como el Fiofío Pico Corto, *Elaenia parvirostris*), a ser: conspicuo semicopete dividido por triángulo blanco que llega hasta la nuca, y pecho gris oliváceo.

En Argentina habitan dos razas de la especie, una en el sudoeste y la otra en el noroeste del país. La raza del sur nidifica en la Patagonia durante la primavera y verano, apareciendo en el centro del país y aún más al norte en otoño e invierno (Narosky & Izurieta, 2010). En la Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (Pugnali y Chamorro, 2006) la especie figura en el ANEXO I, Status A, donde se listan las

especies con menos de tres registros y que carecen de evidencias físicas.

El 15 de abril de 2011, durante una salida de observación a la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS), pude observar un ejemplar de Fiofío Silbón en el Camino del Medio, al posarse sobre un Curupí (*Sapium haematospermum*). Se notaba claramente el semicopete referido anteriormente, con el triángulo blanco visible a simple vista. El ejemplar posó en la copa del árbol de baja altura, lo que concuerda también con su costumbre de posar en sitios visibles referida por Narosky & Izurieta (2010). Tras alejarse volando volví a encontrarlo sobre otro Curupí, donde fue posible observarlo desde atrás, notándose la continuación del triángulo blanco en semicopete, que llegaba hasta la nuca. Al instante inició vuelo, alejándose. Luego pude verlo nuevamente sobre el primer Curupí desplegando todos sus rasgos característicos, incluido el pecho gris oliváceo. El ejemplar no fue fotografiado. En el mismo sitio había también otras especies que llegan al área en época invernal, como el Cortarramas (*Phytotoma rutila*) y la Calandria Real (*Mimus triurus*).



ECOREGISTROS REVISTA - Artículo Nº 9 - 2011

Al día siguiente (16 de abril) volví a ver un individuo de la especie, ésta vez sobre el Camino de los Plumerillos, en la copa de un Ceibo (*Erythrina crista-galli*) donde permaneció brevemente, antes de alejarse.

Estos nuevos registros de Fiofío Silbón constatan la presencia actual de la especie en la RECS.

BIBLIOGRAFÍA

NAROSKY, T & D. YZURIETA. 2010. Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: guía de identificación edición total – a field guide total. - 16a ed. - Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.

PUGNALI, G. Y P. CHAMORRO (compiladores). 2006. Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires.